

Chapitre 1

Les opiacés et
opianalgésiques



*Papaver
somniferum*

Hermans FARM2129 - 8

Douleur : introduction

RAPPEL

Définition :

Perception désagréable et expérience émotionnelle associées à un dommage tissulaire réel ou potentiel

Rôle :

Mécanisme de défense de l'organisme
Favorise la cicatrisation, la récupération

Types :

par excès de nociception, neurogène, psychogène, cancéreuse

Origines :


Peau, viscères, muscles squelettiques, articulations, méninges (et tronc cérébral), tumeurs

Hermans FARM2129 - 9



Apparition et évolution du stimulus douloureux

Douleur primaire - Aiguë, incisive, localisée
Fibres A δ myélinisées (rapides 12-30 m/s)

Douleur tardive - Diffuse, profonde, brûlante
Fibres C non myélinisées (lentes 0.5 - 2 m/s)



Hermans FARM2129 - 10



Hermans FARM2129 - 11

Les thérapeutiques de la douleur

Le schéma de l'Organisation Mondiale de la Santé prévoit 3 étapes dans le traitement de la douleur.

- La première étape prévoit l'administration d'un analgésique courant comme l'acide acétylsalicylique ou le paracétamol.
- La deuxième étape prévoit l'association d'un analgésique narcotique mineur comme la codéine à un analgésique courant.
- La troisième étape prévoit le passage à un analgésique narcotique majeur comme la morphine.

Hermans FARM2129 - 12

Chimie des alcaloïdes dérivés de l'opium



Opium

Dérivés Phénantrène

- Morphine
- Codéine
- Thébaïne

(semi-synthétiques : oxycodone,
naloxone, étorphine)

Analgésie (+)


Dérivés Benzylisoquinoléines

- Papavérine
- Noscapine

Analgésie (-)

Hermans FARM2129 - 13

Chimie des alcaloïdes naturels de l'opium



Altérations de structure modifient la pharmacocinétique

- Alkyl en (1) diminue l'activité analgésique
- Acyl en (1) augmente l'activité analgésique
- Oxydation en (2) augmente l'activité analgésique
- La réduction de la double liaison (3) réduit l'activité

Utilisée en
hémisynthèse

Les opiacés endogènes

- Proenképhaline (proenképhaline A),
précurseur peptidique des Leu-enképhalines et Met-enképhalines
- Prodynorphine (proenképhalin B):
précurseur peptidique des dynorphines
- Pro-opiomélanocortine (POMC) :
précurseur des endorphines

Dérivés de la proenképhaline

met-enképhaline	Tyr-Gly-Gly-Phe-Met
leu-enképhaline	Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
met-enképhaline-8	Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly-Leu
met-enképhaline-Arg ⁶ -Phe ⁷	Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Phe


Dérivés de la prodynorphine

α -néo-endorphine	Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro-Lys
β -néo-endorphine	Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro
dynorphine A-(1-8)	Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile
dynorphine A- (1-17)	Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Lys-Leu-Trp-Asp-Asn-Gln
dynorphine B-(1-13)	Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Gln-Phe-Lys-Val-Val-Thr

Dérivés de la POMC (pro-opiomélanocortine)

β -endorphine	Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Val-Lys-Asn-Ala-His-Lys-Lys-Gly-Gln
---------------------	---

Ligands endogènes et précurseurs



Représentation de l'organisation des peptides actifs au sein des 3 précurseurs

Katzung, 1998

Hermans FARM2129 - 16

Les inhibiteurs d'enképhalines *Une piste future?*

Finalité : induire l'analgésie 'in situ' en favorisant l'activité des peptides endogènes

Composés : Thiorphan
Kélatorphan
Acétorphan


Hermans FARM2129 - 17

Le système opiacé dans le système nerveux central

- **Tronc cérébral :**
 - Contrôle de la respiration, de la toux, du diamètre pupillaire, des nausées et vomissements, de la pression artérielle et des secrétions digestives
- **Thalamus médian :**
 - Contrôle de la douleur profonde
- **Moelle épinière :**
 - Contrôle de la douleur
- **Hypothalamus :**
 - Contrôle des secrétions endocrines
- **Système limbique :**
 - influence les comportements émotionnels

Hermans FARM2129 - 18

Voies ascendantes



Voies descendantes

RAPPEL

Les voies descendantes de la douleur

CORTEX et HYPOTHALAMUS

MESENCEPHALE

BULBE

CORNE DORSALE



Hermans FARM2129 - 19

Les voies descendantes de la douleur

RAPPEL

Plusieurs régions supérieures sont impliquées


- Cortex et hypothalamus
- Mésencéphale
(substances grises péri-aqueducale et périventriculaire)
- Bulbe
(noyau raphé et bulbe rostroventral)
reçoivent des influx sérotoninergique et noradrénergique
des systèmes mésencéphaliques

qui projettent sur les relais de la corne dorsale




où s'opère un contrôle inhibiteur sur des neurones et interneurons nociceptifs

Hermans FARM2129 - 20


La morphine agit à de multiples niveaux de la transmission des informations nociceptives



Hermans FARM2129 - 21



Récepteurs morphiniques (opiacés)




- ◆ 3 sous-types : mu (μ) delta (δ) kappa (κ)
- ◆ Environ 60% d'homologie entre eux
- ◆ Récepteurs couplés aux protéines G

Ligands endogènes (peptides)

<u>Peptide endogène</u>	<u>μ</u>	<u>δ</u>	<u>κ</u>
β -endorphin	+++	+++	+++
Leu-enképhalin	+	+++	-
Met-enképhalin	++	+++	-
Dynorphin	++	+	+++

Hermans FARM2129 - 24

Mécanismes moléculaires impliqués dans les effets des opiacés



Hermans FARM2129 - 25

Implications fonctionnelles des récepteurs aux opiacés

• Récepteur Mu

- Analgesie supra-spinale (μ_1)
- Analgesie spinale (μ_2)
- Analgesie périphérique
- Dépression respiratoire (μ_2)
- Euphorie
- Sédation
- Dépendance physique
- Constipation
- Rétention urinaire
- Nausée, vomissements
- Myosis

• Récepteur Delta

- Analgesie spinale (δ_1)
- Analgesie supra-spinale (δ_2)
- Dépression respiratoire
- Nausée, vomissements

• Récepteur Kappa

- Analgesie spinale
- Analgesie périphérique
- Myosis
- Sédation
- Dysphorie

Hermans FARM2129 - 26


Implications fonctionnelles des récepteurs aux opiacés

	μ	δ	κ
Analgesia			
Supraspinal	+++	-	-
Spinal	++	++	+
Peripheral	++	-	++
Respiratory depression	+++	++	-
Pupil constriction	++	-	+
Reduced GI motility	++	++	+
Euphoria	+++	-	-
Dysphoria	-	-	+++
Sedation	++	-	++
Physical dependence	+++	-	+



Hermans FARM212

Chimie des alcaloïdes morphiniques semi-synthétiques




Semi-synthèse :
au départ de la
thébaïne et de la
morphine

Chimie des alcaloïdes morphiniques entièrement synthétiques

Noyau morphinane


(perte du pont oxygène entre les cycles A et C)

ex : dextrométhorphan (antitussif)




Noyau benzomorphane

ex : pentazocine



Chimie des alcaloïdes morphiniques entièrement synthétiques

Phénylpipéridines




*Aussi des dérivés à activité uniquement périphérique :
diphénoxylate et lopéramide (antidiarrhéiques)*

Hermans FARM2129 - 30

Chimie des alcaloïdes morphiniques entièrement synthétiques

Aryl-propyl-amines acycliques



Hermans FARM2129 - 31

Classification des analgésiques opiacés

- **AGONISTS PUISSANTS**
 - Utilisés pour le traitement des douleurs sévères
 - Activent les récepteurs mu et kappa dans le SNC.

Morphine
 Méthadone
 Méperidine
 Fentanyl
 Oxycodone
 Lévorphanol

- **AGONISTES MODERES**
 - Utilisés pour traiter les douleurs d'intensité moyenne
 - Activent les récepteurs mu et kappa

Codéine
 Propoxyphène
 Tramadol

- **COMPOSES MIXTES AGONISTES - ANTAGONISTES**
 - Analgésiques efficaces avec moins de risque de dépendance et de tolérance
 - stimulent les récepteurs kappa et bloquent les récepteur mu

Pentazocine
 Nalbuphine
 Butorphanol

- **ANTAGONISTES**
 - Bloquent tous les récepteurs opiacés
 - Utilisés dans le traitement des intoxication (overdose)

Naloxone
 Naltrexone

Profil pharmacologique des opiacés

	<i>mu</i>	<i>delta</i>	<i>kappa</i>
agonistes			
<i>morphine</i> <i>codéine</i>	+++	+	+
<i>méthadone</i>	+++		
<i>fentanyl</i>	+++	+	
<i>d-propoxyphène</i>	+++	+	+
agonistes-antagonistes			
<i>buprenorphine</i>	(+++)		--
<i>pentazocine</i>	(+++)		+
<i>nalbuphine</i>	--		++
<i>nalorphine</i>	--		(++)
antagonistes			
<i>naloxone</i>	---	--	--

+ effet agoniste, (+) effet agoniste partiel, [-] effet antagoniste

http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/

Actions générales des opiacés (1)

A. Système nerveux central :

1. Altération de l'humeur (dysphorie, euphorie) et de l'attention (sommolence)
2. Analgésie : effet à la fois sur les aspects sensoriels de la douleur et émotionnels (+ diminution des réactions liées à la perception douloureuse). Cette analgésie se fait sans perte de conscience.
3. Nausées et vomissements (stimulation directe de la Chemoreceptor trigger zone - CTZ)
4. Dépression respiratoire (réduction de la sensibilité au CO₂), également broncho-constriction.
5. Inhibition du réflexe de la toux (propriétés antitussives)
6. Myosis (pas de tolérance, cfr supra)

Hermans FARM2129 - 34

Actions générales des opiacés (2)

B. Système gastro-intestinal :

1. Augmentation du tonus de la musculature lisse (sphincters)
2. Diminution du péristaltisme
3. Augmentation de la pression dans le tractus biliaire

▶ **Bilan** : Constipant / antidiarrhéique
Utilisation de composés à action excl. périphérique
(cfr pharmacocinétique) *Lopéramide, Diphénoxylate*

C. Système cardiovasculaire :

1. Dilatation artériolaire et veineuse
(hypotension orthostatique, vasodilatation cutanée, rougeur)
2. Bradycardie

Hermans FARM2129 - 35


Indications thérapeutiques des opiacés

A. Analgésie (composés à action centrale)

Note : 10 mg morphine \equiv 120 mg codéine \equiv 500 mg aspirine

B. Traitement antidiarrhéique

C. Traitement antitussif



Hermans FARM2129 - 36

Morphine: effets indésirables

- Aux concentrations thérapeutiques :
 - Nausée, vomissements
 - Constipation
 - Somnolence
 - Rétention urinaire
 - Myosis
- Surdosage :
 - Dépression respiratoire
 - Hypotension
- Après administrations répétées :
 - Tolérance et dépendance

Hermans FARM2129 - 37

Morphine : pharmacocinétique

- Administration : *toutes les voies* sont utilisables.
 1. Voie orale : effet de premier passage hépatique très important et variable.
Résorption : 30 à 50 %
 2. Voie intra-veineuse
 3. Voie sous-cutanée
 4. Voie intra-thécale (*plus rare*)
- Passage de la barrière hémato-encéphalique
- Passage de la barrière placentaire (syndrome de sevrage chez le nouveau-né d'une mère toxicomane).
- Métabolisme hépatique, variable.
- Élimination par toutes les sécrétions : bile, urine, salive, (lait!).
- Demi-vie assez courte (2-3 h). Administration répétées toutes les 3-4 h. Formulations galéniques à libération retard, pompes!.

Standard : 10 mg toutes les 4 heures

Hermans FARM2129 - 38

Tolérance aux opiacés

- Nécessité d'augmenter les doses pour obtenir le même effet.
- Surtout observée pour les propriétés d'analgésie, d'euphorie, de sédation et de dépression respiratoire.
- Importante tolérance croisée entre les différents opiacés.

Tolérance élevée

- Analgésie
- Euphorie/dysphorie
- Sensation de bien-être
- Sédation
- Dépression respiratoire
- Effet antidiurétique
- Nausées - vomissements
- Effet antitussif

Tolérance moyenne

- Bradycardie

Pas de tolérance

- Myosis
- Constipation
- Convulsion

Hermans FARM2129 - 39

Dépendance physique aux opiacés

- Le syndrome d'abstinence (de sevrage) apparaît lors de l'arrêt brutal du traitement :
 - agitation
 - frissons
 - accélération du pouls
 - accélération de la respiration
 - hypertension artérielle
 - fièvre
 - vomissements
 - diarrhée
- L'intensité des symptômes dépend
 - de la demi-vie de la substance
 - du degré de dépendance physique
- Le syndrome peut être déclenché par l'administration de composés présentant une composante antagoniste

+ Dépendance psychique
envie irrésistible de se procurer de la drogue

Hermans FARM2129 - 40

Comparaison de la durée d'action, de l'activité, et de la dépendance des divers opiacés utilisés en thérapeutique

Dépendance : implication de l'activité agoniste mu.

Generic Name	Duration of Analgesia (hours)	Maximum Efficacy	Addiction/Abuse Liability
Morphine	4-5	High	High
Hydromorphone	4-5	High	High
Oxymorphone	3-4	High	High
Methadone	4-6	High	High
Meperidine	2-4	High	High
Fentanyl	1-1.5	High	High
Sufentanyl	1-1.5	High	High
Alfentanil	0.25-0.75	High	High
Levorphanol	4-5	High	High
Codeine	3-4	Low	Medium
Oxycodone ¹	3-4	Moderate	Medium
Dihydrocodeine ¹	3-4	Moderate	Medium
Propoxyphene	4-5	Very low	Low
Pentazocine	3-4	Moderate	Low
Nalbuphine	3-6	High	Low
Buprenorphine	4-8	High	Low
Butorphanol	3-4	High	Low

Hermans FARM2129 - 41

Katzung, 1998

Les opiacés : usages et particularités

Morphine

- 'Chef de file' et souvent premier choix comme analgésique puissant des douleurs sévères.
- Nausées et vomissements fréquents
- Euphorisant et 'soulagement nerveux'
- Administrations toutes les 4 heures (ou 12 h si formulation retard)
- Dépendance physique, psychique et tolérance

Stupéfiant

Préparation magistrale standard :
"sirop de morphine"

R/ Morphine chlorhydrate trois cent milligrammes

Aqua conservans 300 ml.

Ce sirop se conserve deux semaines à l'abri de la lumière.

Codéine (aussi antitussif)

- Bien résorbé par voie orale
- Partiellement métabolisée en morphine (CYP2D6) et dihydrocodéine. → 10% patients 'résistants'
- Efficace pour les douleurs faibles ou modérées
- Très constipant (pas d'utilisation prolongée)
- apparenté : Dihydrocodéine (aussi antitussif) + aussi Hydrocodone
 - analgésie semblable à la codéine
 - risques de nausées et vomissements fréquents

Hermans FARM2129 - 42

Les opiacés : usages et particularités

Dextropropoxyphène

- Utilisé seul : analgésique faible (plus faible que la codéine, mais agit plus longtemps)
- Combinaisons avec paracétamol ou aspirine
- Note : surdosage = dépression respiratoire (dextropropoxyphène) et hépatotoxicité (paracétamol).

Tramadol

- Analgésie par double mécanisme :
 - Effet opiacé (faible)
 - Augmente la transmission serotoninergique et adrénergique (inhibition recapture)
- Peu d'effets secondaires opiacés

Hermans FARM2129 - 43

Les opiacés : usages et particularités

Buprénorphine

- Activité mixte agoniste (ou antagoniste?) kappa et agoniste partiel mu (ne pas associer à morphine, sinon sevrage)
- Durée d'action prolongée (6-8 h d'effet).
- Sublingual ou injection (i.m. ou i.v.)
- Mais aussi (et surtout) **en patches!** (3 jours)
- Les effets ne sont pas antagonisés par la naloxone parce que dissociation lente des récepteurs mu
- Intérêt en détoxification

Spécialement
réglementé

Fentanyl

- 300 fois plus puissant que la morphine.
- Usage en anesthésiologie (en injection)
- **Usage en patches** (voie transdermique) ayant un effet pendant 3 jours
- Effets anticholinergiques
 - Note : apparenté : réfentanyl : métabolisme très rapide, action très rapide et brève
 - Note : apparenté : sulfentanyl : plus puissant que fentanyl
 - Note : apparenté : alfentanyl : plus faible et plus bref que fentanyl

Stupéfiant

Hermans FARM2129 - 44



27 octobre 2002



Unexpected "Gas" Casualties in Moscow:
A Medical Toxicology Perspective

Carfentanyl ?

Hermans FARM2129 - 45


Les opiacés : patches


Fentanyl et Buprénorphine

Avantages :

- compliance du patient
- facilité d'usage
- peu d'abus (>< toxicomanie)
- concentration plasmatique constante
- conservation

Mais.... le prix ! ± € 10.00/patch









New : aussi
Butorphanol 
en spray nasal

Les opiacés : sub-lingual


Buprénorphine (usage sub-lingual)

Double indication :

- traitement de la douleur (Temgesic[®])
- Prise en charge de la toxicomanie (Subutex[®])

Subutex (Schering-Plough)	
[buprénorphine] compr. (subling.)	
 7 x 0,4 mg	Rx: b
 7 x 2 mg	Rx: b
 7 x 8 mg	Rx: b
(pour le traitement de substitution chez les toxicomanes)	
(médicament spécialement réglementé)	
Temgesic (Schering-Plough)	
[buprénorphine] compr. (subling., séc.)	
 20 x 0,2 mg	Rx: b
 50 x 0,2 mg	Rx: b
amp. i.m. ou i.v.	
 5 x 0,3 mg/1 ml	Rx:
Posol.	
- subling.: 0,2 à 0,4 mg toutes les 6 à 8 h	
- i.m. ou i.v. lente: 0,3 à 0,6 mg toutes les 6 à 12 h	
(médicament spécialement réglementé)	

Jacob et al., 1979 Mixed agonist-antagonist opiates and physical dependence. Br J Clin Pharmacol. 1979;7 Suppl 3:291S-296S



Rem :

notion d'**activité mixte** agoniste/antagoniste

Pentazocine : agoniste kappa et antagoniste mu

notion d'**agonisme partiel**

Buprénorphine : agoniste partiel mu

Hermans FARM2129 - 48

Les opiacés : usages et particularités

Méthadone

- Peu sédatif
- Action prolongée (éviter accumulation : max 2 x par jour)
- Administration orale
- Usage principal : détoxification Sevrage plus modéré (mais plus long)
 - Note : apparenté : lévométhadyl acétate (L- α -acétylméthadol) présente une demi-vie encore plus longue (premiers symptômes de sevrage après 72 h)

Stupéfiant

Pethidine (synonyme mépéridine) - très similaire à la morphine

- Analgésie rapide et brève
- Efficacité moyenne (ne convient pas pour douleurs sévères)
- Norpéthidine, Métabolite neuroexcitateur (convulsions) (! accumulation insuffisance rénale).

Stupéfiant

Hermans FARM2129 - 49

Les opiacés : usages et particularités

Nalbuphine

- Activité mixte agoniste kappa puissant (douleur) et antagoniste mu
- Uniquement en injectable
- Efficacité analgésie similaire la morphine
- Moins d'effets secondaires (nausées et vomissements), moins de risque de dépression respiratoire
- Mais pas d'antagonisme par la naloxone
- Moins de dépendance (?)

Pas en Belgique

Pentazocine

- Activité mixte agoniste kappa (douleur) et antagoniste mu (ne pas associer à morphine) (risque de crise de sevrage chez toxicomanes).
- Efficacité moyenne (moins que morphine, mais mieux que codéine)
- Hallucinations, troubles cardiovasculaires
- Moins de dépendance (?)

Spécialement réglementé

Hermans FARM2129 - 50

Les opiacés : usages et particularités

Naloxone

- ANTAGONISTE opiacé pur, plus puissant sur les récepteurs mu.
- Administration en urgence par injection i.v.
- Traitement des intoxications (overdoses)
- Durée d'action courte, nécessite de répéter l'administration (sinon, symptômes du surdosage réapparaissent 1 à 2 h après injection)



note : Naltrexone, autre antagoniste pur.

- Durée d'action prolongée
- Voie orale
- Usage dans les cures de désintoxications (si le toxicomane accepte !)

- Association Naloxone + Tilidine (agoniste d'efficacité moyenne) permet d'éviter les abus. Par voie orale
 - Basse dose (dose thérapeutique) : La naloxone est métabolisée par effet de premier passage et n'affecte pas l'action analgésique de la tilidine.
 - Dose élevée (toxicomanes) : L'effet de premier passage pour la naloxone est saturé. Les effets de la tilidine sont antagonisés. La naloxone empêche l'action euphorique de la tilidine.

Hermans FARM2129 - 51

Chapitre 1 en résumé :

Les opiacés

Analgésiques puissants

morphine
 méthadone
 bézitramide
 buprénorphine
 dextromoramide
 fentanyl
 piritramide

Analgésiques de puissance intermédiaire

péthidine
 pentazocine
 tilidine

Analgésiques peu puissants



codéine
 dihydrocodéine
 dextropropoxyphène

tramadol


Les antagonistes

naloxone nalotrexone


Addendum : Chimie des opiacés (1)



Addendum : Chimie des opiacés (2)




Naloxone




Naltrexone

(C) Opioid Antagonists




Nalorphine



Pentazocine

(D) Mixed Agonists-Antagonists



Buprenorphine

(E) Partial Agonist