


# Ribosome bactérien comme cible d'antibiotiques

**Antibiotiques  
actifs sur 30S**



07/11/2008

05: Ribosome-30S

1


**TETRA- et GLYCYL-CYCLINES**

07/11/2008

05: Ribosome-30S

2

## Structure chimique des tétracyclines




| molécule     | -R <sub>4</sub> | -R <sub>3</sub>  | -R <sub>2</sub>                   | -R <sub>1</sub>  |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| tetracycline | -H              | -OH              | -H                                | -H               |
| doxycycline  | -H              | -CH <sub>3</sub> | -H                                | -OH              |
| minocycline  | -H              | -H               | -N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | -CH <sub>3</sub> |

07/11/2008

05: Ribosome-30S

3

## Mode d'action



© Elsevier 2004. Infectious Diseases 2e - www.idreference.com

- pénétration dans la bactérie
- piégeage sous forme de sel de Mg<sup>2+</sup> (substrat des pompes à efflux)
- inhibition de la synthèse protéique
  - liaison à l'unité 30S
  - prévention de l'accès du AA-tRNA au site A

### Action peu spécifique

Capacité d'interaction également avec les ribosomes de parasites et de cellules eucaryotes dans une moindre mesure

07/11/2008


05: Ribosome-30S

4

## Mécanismes de résistance

- défaut de concentration dans la bactérie
  - diminution de l'activité du transporteur d'entrée
  - efflux actif
    - Pompes Tet à tétracyclines chez les Gram(+) et les Gram(-)
    - Pompes à large spectre chez les Gram(-): Résistances croisées

### Exemple: la pompe AcrAB-ToIC de *E. coli*




07/11/2008

05: Ribosome-30S

5

## Mécanismes de résistance

- protection ribosomiale
- production de protéines cytoplasmiques capables de déloger les tétracyclines de leur cible



Connell et al. AAC (2003) 47:3675-81

07/11/2008


05: Ribosome-30S

6

## Et les glycyclines ?

tigécycline

minocycline





07/11/2008

05: Ribosome-30S

7

## glycyclines : action et résistance



Olson *et al.*, AAC (2006) 50:2156-66

07/11/2008


05: Ribosome-30S

8

## Epidémiologie de la résistance aux tétracyclines en Belgique

Evolution au cours des dernières années  
(souches non invasives de streptocoques)

### MLS+TET



Vanhoof et al, 2007; données de l'Institut Pasteur de Bxl

07/11/2008

05: Ribosome-30S

9

## Spectre d'activité et indications

- tétracyclines: spectre extrêmement large  
Gram-positifs, Gram négatifs, intracellulaires, anaérobies  
Activité intrinsèque minocycline et doxycycline >> tétracycline

Usage inconsidéré, la plupart des bactéries sont devenues résistantes ...  
Quelques indications marginales restent acceptables :

infections de la peau et des tissus mous:  
acné : *Propionibacterium acnes*  
maladie de Lyme : *Borrelia burgdorferi*  
infections respiratoires à germes intracellulaires :  
*Chlamydia*, *Mycoplasma*  
infections génitales :  
*Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*,  
*Treponema pallidum* (syphilis)  
Infections particulières  
*Rickettsia*, amibes

07/11/2008

05: Ribosome-30S

10

## Spectre d'activité et indications



- glycyclcyclines: spectre très large  
Bactéries à Gram-positif,  
et Gram-négatif sauf *Pseudomonas aeruginosa*  
(résistance intrinsèque par efflux actif),  
anaérobies

Indications limitées pour éviter l'émergence de résistance;  
intérêt dans les infections polymicrobiennes :

infections compliquées de la peau et des tissus mous [Gram(+)]:  
*S. aureus* multirésistant, Streptocoques, *B. fragilis* , ...

infections intra-abdominales [Gram(-)] :  
*E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, entérocoques, *B. fragilis*, ...

07/11/2008

05: Ribosome-30S

11

## Pharmacocinétique



- Absorption      bonne biodisponibilité orale  
MAIS formation de complexes  
non résorbés avec les ions bivalents

Interaction  
avec aliments  
et médicaments

tigecycline disponible uniquement sous forme injectable  
(limitation au milieu hospitalier)

- Distribution      distribution large, sauf sans le SNC  
accumulation cellulaire  
fixation aux os et aux dents

indications intracell.

effets secondaires

- Elimination      métabolisme hépatique partiel  
élimination rénale pour la tigecycline  
 $t_{1/2}$  environ 20h mino, doxy, tige

Interactions médic.  
via CYP450

administration 1X/jour

07/11/2008

05: Ribosome-30S

12

## Tétra- et glycy-clines: pharmacocinétique et posologie

|                 | dose <i>po</i>                          | pic<br>sérique<br>(mg/l) | absorption<br>(% de la dose) | liaison<br>prot.<br>(%) | t <sub>1/2</sub><br>(h) |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| oxytétracycline | 250–500 mg 4x/jour                      | 0.9                      | 58                           | 35                      | 10                      |
| tétracycline    | 250–500 mg 4x/jour                      | 2.2                      | 77                           | 65                      | 6-8                     |
| minocycline     | 100-200 mg 1x/jour<br>ou 100 mg 2x/jour | 2.5                      | 95                           | 76                      | 15                      |
| doxycycline     | 100-200 mg 1x/jour<br>ou 100 mg 2x/jour | 2.5                      | 93                           | 93                      | 15-20                   |
| tigécycline     | 100 mg 1x/jour (IV)                     | 1-1.5                    | --                           | 70-90                   | 27                      |

07/11/2008


05: Ribosome-30S

13

## Effets secondaires



- effet photosensibilisant
- fixation aux os et aux dents (coloration jaune)  
→ contre-indiqué chez les enfants  
et les femmes enceintes
- adhérence oesophagienne et ulcération  
→ administration en position assise avec un grand verre d'eau
- rarement, toxicité hépatique ou rénale
- thrombophlébite lors de l'injection intra-veineuse



J Clin Pathol. (1962) 15:112–115.

07/11/2008

05: Ribosome-30S

14



## Interactions médicamenteuses

- Formation de complexes non résorbés avec les ions bi- ou tri-valents (calcium, magnésium, fer, zinc, bismuth)



Prendre à distance des aliments ou médicaments qui en contiennent

*Quelques exemples :*

*antacides, sucralfate, didanosine, multivitamines...*

- métabolisme accru en présence d'inducteurs hépatiques

*Quelques exemples :*

*carbamazépine, phénytoïne*

- risque d'hémorragie avec les anticoagulants oraux (réduction de la production de VitK par flore digestive)

- perte d'efficacité des contraceptifs oraux (réduction du métabolisme intestinal des conjugués aux oestrogènes)

07/11/2008

05: Ribosome-30S

15

## Conseils pharmacothérapeutiques lors de la délivrance d'une tétracycline

Prescription chez une femme de 25 ans  
Indication potentielle: infection gonococcique

prise d'autres médicaments ?  
contraceptifs ?  
compléments alimentaires ?

matin et soir, avant le repas  
avec un grand verre d'eau  
en position assise

pas d'exposition au soleil

Dr A. Dupont  
Av. Mounier 1  
1200 Bruxelles  
02/771.00.00  
OM 3456

20/08/2008

PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS

07/11/2008

05: Ribosome-30S

16

# AMINOGLYCOSIDES

07/11/2008


05: Ribosome-30S

17

## La streptomycine: découverte par S. Waksman en 1943 par criblage systématique...



*streptomyces griseus*



Waksman and Fleming ...



From the point of view of human benefit, never was a Nobel prize so justifiably awarded as was the award to Selman Waksman for the discovery of streptomycin and other antibiotics produced from *Streptomyces* spp. Waksman and his talented team (many of whom went on to make important antibiotic discoveries in their own right) developed the concept of **systematic screening** of microbial culture products for biological activity, a technology which has provided the foundation of the antibiotic industry, and for this alone his name should rank high in any pantheon of microbiology.


J. Davies: In Praise of Antibiotics, ASM News  
<http://www.asm.org/memonly/asmnews/may99/feature6.html>

07/11/2008

05: Ribosome-30S

18

## Streptomycine: propriétés générales




- spectre large incluant les Gram (+) et les Gram (-) et le bacille de la tuberculose
- agit en se liant à l'unité 30 S du ribosome et inhibe la synthèse protéique tout en causant des erreurs de lecture de de l'ARNm, donnant naissance à des protéines anormales et/ou tronquées
- fortement bactéricide de façon concentration-dépendante
- mais a donné lieu rapidement à des émergences de résistance (principalement par mutation ribosomiale) et cause de l'ototoxicité (dihydrostreptomycine surtout)
- utilisée rarement aujourd'hui sauf pour la tuberculose, la tularémie, la peste, et certaines endocardites

07/11/2008

05: Ribosome-30S

19

## Mode d'action



*Effects of aminoglycosides on protein synthesis.*

**A.** Aminoglycoside (represented by closed circles) binds to the 30 S ribosomal subunit and interferes with initiation of protein synthesis by fixing the 30 S-50 S ribosomal complex at the start codon (AUG) of mRNA. As 30 S-50 S complexes downstream complete translation of mRNA and detach, the abnormal initiation complexes, so-called streptomycin monosomes, accumulate, blocking further translation of message. Aminoglycoside binding to the 30 S subunit also causes misreading of mRNA, leading to **B.** premature termination of translation with detachment of the ribosomal complex and incompletely synthesized protein, or **C.** incorporation of incorrect amino acids (indicated by the "X"), resulting in the production of abnormal or nonfunctional proteins.


Goodman & Gilman's, 10th ed. p 1222

07/11/2008

05: Ribosome-30S

20

## Comment les aminoglycosides induisent-ils des erreurs de lecture ?




J. M. Ogle et al., *Science* (2001) 292, 897 -902

07/11/2008

05: Ribosome-30S

21

## Logique du développement à partir des années '60




07/11/2008

05: Ribosome-30S


22

## Logique du développement à partir des années '60



- activité raisonnable sur les Gram (-)  
SM-résistants
- toxicité modérée
- succès clinique important (1960-1980),

grand succès clinique  
depuis 1965 !!  
"gentamicine" ...




07/11/2008

05: Ribosome-30S

23



## Mais ... émergence rapide de résistance par inactivation enzymatique...




07/11/2008

05: Ribosome-30S

24





## Mécanismes de résistance

- inactivation enzymatique
  - phosphorylation et adenylation des hydroxyles
  - acétylation des amines
- imperméabilisation
  - réduction de pénétration chez les staphylocoques
  - efflux actif chez *Pseudomonas*
    - (résistance croisée avec fluoroquinolones et certaines céphalosporines)
- modification de la cible par méthylation
  - méthylases plasmidiques chez les entérobactéries,
  - risque de dissémination rapide !

07/11/2008 05: Ribosome-30S 28

## Spectre d'activité

- bactéries à Gram-positif  
essentiellement, staphylocoques et entérocoques
- principalement, bactéries à Gram-négatif  
y compris *Pseudomonas* et entérobactéries
- inactifs sur les anaérobies  
entrée dans la bactérie médiée par un transporteur oxygène-dépendant


07/11/2008

05: Ribosome-30S


29

## Pharmacodynamie

antibiotiques concentration-dépendants: optimiser le rapport PIC/CMI (> 8) !



in vitro data – Craig et al. , 1992



clinical data

07/11/2008

05: Ribosome-30S

30

## Pharmacocinétique



- Absorption nulle par voie orale (molécules polaires!)  
administration iv de préférence à im
- Distribution dans les fluides extracellulaires ( $V_d \sim 0.2 \text{ L/kg}$ )  
(non diffusibles à travers les membranes)  
accumulation de 5 % de la dose dans le rein et l'oreille
- Elimination par voie rénale; pas de métabolisation

Pharmacodynamie !

Toxicité !

07/11/2008

05: Ribosome-30S

31



## Interactions médicamenteuses

- médicaments qui augmentent le risque de blocage neuromusculaire:  
curarisants
- médicaments qui favorisent le développement de la toxicité:  
diurétiques  
médicaments néphrotoxiques,  
dont plusieurs anti-infectieux susceptibles d'être coadministrés  
(vancomycine, céphaloridine, amphotéricine, adéfovir, ... )
- médicaments présentant une incompatibilité chimique ;  
→ ne pas administrer dans la même solution de perfusion  
héparine,  $\beta$ -lactames (et autres substances anioniques).

07/11/2008

05: Ribosome-30S

32

## Indications des aminoglycosides



- premier choix : infections sévères à Gram(-) en milieu hospitalier

*Quelques exemples :*

*pneumonie nosocomiale, infections abdominales ou pelviennes*

- en association:

- +  $\beta$ -lactame (combinaison synergique): endocardite à entérocoque
- en trithérapie: tuberculose

- administration non parentérale:

- usage topique (collyre, gouttes auditives)
- voie orale: décontamination digestive



Toxicité auditive !  
Pas de goutte otique  
contenant ces médicaments  
sans avis médical!

07/11/2008

05: Ribosome-30S


33

## Effets secondaires

- blocage neuro-musculaire (compétition avec le  $\text{Ca}^{2+}$  dans les plaques motrices)  
→ injection lente (perfusion sur 30 minutes)
- toxicité rénale et auditive (organes où l'accumulation est préférentielle)

### Capture par endocytose

- adsorptive (PL acides)
- récepteur-médiée (mégaline; récepteur aux composés polybasiques)




07/11/2008

05: Ribosome-30S

34

## Aminoglycosides et toxicité ...

Patients développant une néphrotoxicité  
lors d'un traitement aux aminoglycosides :




07/11/2008

05: Ribosome-30S

35

## Mécanismes de la néphrotoxicité ...




Tulkens, Am. J. Med. (1986) 80(6B): 105-114

07/11/2008

05: Ribosome-30S

36

La néphrotoxicité n'est pas liée au pic ...




07/11/2008

05: Ribosome-30S

37

... car la capture des aminoglycosides par le rein est saturable ...




\* Giuliano et al., (1986) J. Pharm. Exp. Ther

07/11/2008

05: Ribosome-30S

38

## Néphrotoxicité et schéma d'administration en clinique : l'exemple de la nétilmicine ...



ter Braakj et al., Am J Med. 1990 Jul;89(1):58-66.

07/11/2008

05: Ribosome-30S

39

## L'ototoxicité n'est pas davantage liée au pic ...

### Comparison of "once-daily" and a "divided dose" administration schemes on ototoxicity in young patients

no. of patients [over 20 in each group] with lesions\* and  
total no. of frequencies affected

|            | low tone (0.25-8 kHz) | high tone (10-18 kHz) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| amikacin   |                       |                       |
| • q24h     | 1 (1)                 | 3 (4)                 |
| • q12h     | 0                     | 6 (6)                 |
| netilmicin |                       |                       |
| • q24h     | 0                     | 3 (7)                 |
| • q8h      | 2 (3)                 | 8 (9)                 |

\* loss of 15dB or more over baseline(max. loss recorded: 30 dB)

p < 001 by  $\chi^2$  analysis

J Antimicrob Chemother. (1991) 27 Suppl C:49-61.

07/11/2008

05: Ribosome-30S

40



## Schéma d'administration et posologie des aminoglycosides

efficacité ↗↗  
si pic élevé

toxicité ↘↘  
si pic élevé

1 x / jour

monitoring :  
pic ~ efficacité  
vallée ~ toxicité

.... même si la plupart des notices mentionnent encore un schéma d'administration fractionné ....

| aminoglycoside                          | Dosage               |
|-----------------------------------------|----------------------|
| gentamicine, tobramycine<br>nétilmicine | 3-6 mg/kg 1 x/jour   |
| amikacine, isepamicine                  | 15-25 mg/kg 1 x/jour |

07/11/2008

05: Ribosome-30S

41

## Un regard critique sur les notices .....

GEOMYCINE Injection (SCHERING-PLOUGH) [VII A 4]

### Dénomination:

GEOMYCINE® 80 mg/2 ml Ampoule  
GEOMYCINE® 80 mg/2 ml Vial  
GEOMYCINE® 80 mg/2 ml Disposable Syringe

### Composition:

Geomycine 80 mg/2 ml Ampoule et Geomycine 80 mg/2 ml Vial et Geomycine 80 mg/2 ml Disposable Syringe.  
Gentamicin, sulfas (= gentamicin 80 000 U.I. (80 mg)) — Methyl-p-hydroxybenzoas — Propyl-p-hydroxybenzoas — Natri. bisulfurosum — Dinatri. edetas — Aqua ad injectabilia q.s. ad 2 ml.

### Posologie et mode d'emploi:

Le mode d'administration habituel de Geomycine est intramusculaire. L'administration intraveineuse peut également être utilisée.  
Il est conseillé de suivre les concentrations sériques durant le traitement, surtout chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

La posologie peut être adaptée suivant le résultat obtenu pour arriver à des concentrations efficaces mais pas trop élevées.  
Le pic sérique peut atteindre 4 à 6 µg/ml.

Des pics sériques prolongés au-dessus de 12 µg/ml doivent être évités.  
Pour la détermination du pic de concentration, les échantillons de sang seront prélevés une heure après l'administration IM. Pour l'administration IV, le temps de prise de l'échantillon dépend de la vitesse de la perfusion.

On recommande de prélever un échantillon de sang 30 min après une perfusion de 30 min ou bien à la fin d'une perfusion d'1 heure.

On évitera d'administrer la dose suivante, lorsque la concentration sérique résiduelle est supérieure à 2 µg/ml.

### ADMINISTRATION IM.

En présence d'une fonction rénale normale.

Chez l'adulte.

En cas d'infections sévères une dose de 3 mg/kg/jour, répartie en trois doses égales toutes les 8 heures, est recommandée.

Un schéma de posologie simplifiée pourra être:

pour les patients de plus de 60 kg: 80 mg, 3 x par jour,

pour les patients de 60 kg et moins de 60 kg: 60 mg, 3 x par jour.

En cas d'infections létales, des doses pouvant aller jusqu'à 5 mg/kg/jour seront administrées.

Cette dose sera ramenée à 3 mg/kg/jour si l'évolution de la maladie le permet.

### Dernière mise à jour de la notice:

28.04.2003



pic IM << pic IV



PIC / CMI > 8  
→ CMI critique = 0.5




efficacité ↘  
toxicité ↗




la science avance ...

Gentamicin / Escherichia coli  
Antimicrobial wild type distributions of microorganisms - reference database  
EUCAST



et ces germes -là ?

Gentamicin / Staphylococcus aureus  
Antimicrobial wild type distributions of microorganisms - reference database  
EUCAST



07/11/2008


05: Ribosome-30S

42

## Un regard critique sur les notices .....



Gentamicin / *Escherichia coli*  
Antimicrobial wild type distributions of microorganisms - reference database  
EUCAST




Dose adéquate ?

$$\text{CMI} = 2 \rightarrow \text{PIC} = 2 \times 8 = 16 \text{ mg/L}$$

$$\begin{aligned} \text{Dose IV} &= \text{PIC} \times \text{Vd} \\ &= 16 \text{ mg/L} \times 0.2 \text{ L/kg} \\ &= 3 \text{ mg/kg } 1\text{x/jour} \end{aligned}$$

Gentamicin / *Acinetobacter baumannii*  
Antimicrobial wild type distributions of microorganisms - reference database  
EUCAST



$$\text{CMI} = 4 \rightarrow \text{PIC} = 4 \times 8 = 32 \text{ mg/L}$$

$$\begin{aligned} \text{Dose IV} &= \text{PIC} \times \text{Vd} \\ &= 32 \text{ mg/L} \times 0.2 \text{ L/kg} \\ &= 6 \text{ mg/kg } 1\text{x/jour} \end{aligned}$$