



## FARM 2129 : Pharmacologie spéciale


Médicaments du  
système digestif  
(partie haute)  
et antiémétiques






# Médicaments du système digestif (partie haute) et antiémétiques

- antisécrétoires gastriques
- protecteurs de la muqueuse gastrique
- anti-acides de neutralisation
- stimulants de la motricité digestive (partie haute)
- anti-émétiques


# L'estomac est-il (si) acide ?



# Sécrétion acide de l'estomac




**Acid secretion mechanisms in the parietal cell**



L'estomac réalise une production nette d'HCl à partir de  $\text{CO}_2$  et de  $\text{Cl}^-$  grâce à un échange  $\text{HCO}_3^- / \text{Cl}^-$  et  $\text{K}^+ / \text{H}^+$  (énergisé par l'ATP)

<http://meds.queensu.ca/>

# Régulation et points action des médicaments



**Fig. 24.2** Schematic diagram showing the one-cell and two-cell hypotheses of the action of secretagogues on the acid-secreting gastric parietal cell, giving the site of action of drugs influencing acid secretion. Acetylcholine and gastrin may act mainly directly on their receptors (the one-cell hypothesis) or partly directly and partly by releasing histamine (the two-cell hypothesis). ('MC', mast-cell-like, histamine-secreting cell; Hist, histamine; ACh, acetylcholine; MR, muscarinic receptor; H<sub>2</sub>R, histamine H<sub>2</sub>-receptor; GR, gastrin receptor; PGR, prostaglandin E<sub>2</sub> (PGE<sub>2</sub>) receptor; AA, arachidonic acid; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; P, proton pump (H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase); C, symport carrier for K<sup>+</sup> and Cl<sup>-</sup>.)


Rang, 5th ed. p. 369

# Comment contrôler l'acidité gastrique ?

- neutraliser l'acide produit ...
  - problème quantitatif ...
  - problème temporel (acidité nocturne)

antiacides de  
comptoir ...

- bloquer la stimulation cholinergique  
(M1: plexus intramuraux)
  - effets indésirables (anticholinergiques)
  - efficacité limitée




- bloquer la stimulation histaminergique
  - efficacité partielle
  - (interactions médicamenteuses)
- bloquer la pompe à proton

1<sup>ère</sup>  
révolution

2<sup>ème</sup>  
révolution

# De l'histamine aux premier anti-H<sub>2</sub> clinique (cimétidine)

1<sup>ère</sup>  
révolution




Les antagonistes H<sub>2</sub>

1<sup>ère</sup>  
révolution


cimétidine

cause des interférences médicamenteuses




ranitidine


bioisostère (↘↘ interférences !!)



famotidine \*



nizatidine \*



\* commercialisation abandonnée en Belgique

## Antagonistes H<sub>2</sub>: activité ...

---

- antagonistes réversibles à durée de vie courte (1.1 à 4.5 h)
  - ➔ à donner le soir pour contrôle de l'acidité nocturne
  - ➔ efficacité limitée en cas de faible observance
- contrôle uniquement de la voie histaminergique
  - ➔ activité parfois insuffisante ou nulle (si effet non-médié par le récepteur H<sub>2</sub> [action de la gastrine, action cholinergique directe])

traitement	ulcère gastroduonéal *		ulcère gastrique *
	cicatrisation (4 sem.)	récidive (1 an)	cicatrisation (6 sem.)
placébo	40.9 (1386)	73 (398)	40 (363)
cimétidine (800 mg – 1.2 g)	77.3 (745)	34.8 (244)	73 (452)
ranitidine (150-300 mg)	76 (1624)	31.6 (783)	72.6 (560)

\* % (n)

# Antagonistes H<sub>2</sub>: toxicité(s)

---

- cimétidine: interférences médicamenteuses

- phénytoïne → effets toxiques
- anticoagulants → risque hémorragique
- benzodiazépines → somnolence
- β-bloquants → bradycardie
- nifédipine → hypotension
- théophylline → toxicité (palpitations, nervosité, insomnies)
- carmustine → toxicité médullaire
- ciclosporine → toxicité rénale



(ces interférences sont moindres à très faibles pour la ranitidine et les autres anti-H<sub>2</sub>)

- effets indésirables

- céphalées, fatigue
- éruptions cutanées, douleurs musculaires
- confusion mentale (administration parentérale de doses élevées; sujets âgés ou atteints d'insuffisance rénale)
- bradycardie et hypotension lors d'administration intraveineuse
- néphrite interstitielle et hépatite (rares)
- gynécomastie réversible (traitement prolongé avec la cimétidine)
- impuissance (cimétidine).


2<sup>ème</sup> révolution

# Oméprazole: mode d'action...



L'oméprazole est une **prodrogue base faible** qui s'accumule en milieu acide où elle s'active en **sulfénamide réactionnel** si le pH est très bas (canalicule sécrétoire des cellules pariétales de l'estomac). Ce dernier établit un pont S-S avec les cystéines ... (cys 813 de la K<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> ATPase)

## Oméprazole: liaison covalente à la cible ... (visible)



(a) One minute after i.v. injection in the mouse, radiolabelled omeprazole (light areas) is found mainly in the stomach, liver, kidneys and lungs<sup>20</sup>.



(b) Sixteen hours after i.v. injection, high levels of radiolabelled omeprazole (acid-activated form) are found only in the stomach<sup>20</sup>.

# Oméprazole: contrôle de l'acidité sur 24 h ...






Figure 26 Omeprazole. 20 mg once daily, effectively controls 24-hour intragastric acidity. Graph shows the mean decrease of 24-hour intragastric acidity after 7 days of omeprazole 10 mg, 20 mg or 30 mg once daily in 6 patients with duodenal ulcer in remission<sup>5a</sup>.


# Oméprazole: blocage de la production d'H<sup>+</sup> quel qu'en soit le stimulus ...




Stimuli for acid secretion: ○ ○ 50 μM histamine ● ● 1 mM db-c AMP △ △ 0.1 M K<sup>+</sup>

rappel: histamine → récepteur H<sub>2</sub> → AMPc → activation de la K<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> ATPase


# Oméprazole et compagnie ...




lansoprazole





rabéprazole




pantoprazole








ésoméprazole  
(ou S-oméprazole)  
???




# Oméprazole *R* et *S*: même combat ...



mésomère et énantiomère ... pas mère du tout ...



R



S

ni R ni S ...

# Oméprazole – ésoméprazole - quelle différence ?

- L'oméprazole (toutes les formes commerciales) est un mélange racémique des formes *R* et *S* qui sont toutes les deux actives après transformation en sulfénamide (car l'atome chiral à considérer est le soufre (S) qui n'est asymétrique que dans la pro-drogue).
- La forme *S* pure (ésoméprazole) présente uniquement un léger avantage pharmacocinétique qui ne se manifeste qu'avant sa transformation en sulfénamide.
- L'ésoméprazole n'est donc PAS deux fois plus active que le mélange racémique (à l'inverse de la plupart des autres médicaments présentés sous forme de mélange racémique où une forme est active et l'autre pas (exemple: lévocétirizine vs. cétirizine, ou la plupart des  $\beta$ -bloquants), ce qui explique que les doses d'ésoméprazole et d'oméprazole soient les mêmes.



**Nexiam (AstraZeneca)** ▲

[ésoméprazole]  
compr. entér.

€ 14 x 20 mg	Rx b! ○	€ 24,02
€ 28 x 20 mg	Rx b! ○	€ 38,23
€ 56 x 20 mg	Rx b! ○	€ 67,50
€ 14 x 40 mg	Rx	€ 43,53
€ 28 x 40 mg	Rx b! ○	€ 50,35

flacon i.v. - perf.  
€ 10 x 40 mg poudre U.H.  
(énantiomère actif de l'oméprazole)

**Losec (AstraZeneca)** ▲

[oméprazole]  
compr. Mups entér. (disp.)

€ 28 x 10 mg	Rx b! ⊖	€ 24,53
€ 56 x 10 mg	Rx b! ⊖	€ 33,73
€ 28 x 20 mg	Rx b! ⊖	€ 35,08
€ 56 x 20 mg	Rx b! ⊖	€ 50,75
€ 28 x 40 mg	Rx b! ⊖	€ 58,22

flacon perf.  
€ 5 x 40 mg poudre U.H.

# Oméprazole et autres inhibiteurs de pompe à proton (IPP)

---

- administration orale: toujours sous forme gastroprotégée (comprimés ou capsules entériques [ne pas couper, ni écraser, ni mâcher]; formes microdispersibles (grains à enrobage entérique [peuvent être dispersés dans l'eau ou une boisson acide [pas alcaline !] max. 30 min] mais ne pas écraser; administration IV réservée aux patient ne pouvant pas avaler)
- dose unique journalière (sauf vas particulier)
- faibles interactions médicamenteuses pour l'oméprazole (diazépam, warfarine, phénitoïne) \* , et probablement très faibles avec les autres IPP
- attention à la diminution de biodisponibilité des médicaments qui demandent un estomac acide ! (kétoconazole, itraconazole, p.ex.)
- causent de l'hypergastrinémie réactionnelle, mais sans incidence clinique démontrée.

**\* mais voir dias suivantes...**

## IPP et risque cardiovasculaire (en cas de co-administration de clopidogrel)


Folia Pharmacothérapeutica – Février 2009:

Une étude de cohorte rétrospectives suggère que le clopidogrel pourrait être moins efficace chez les patients recevant un IPP.

JAMA 2009; 301: 937-44: 8.205 patients traités par du clopidogrel pour syndrome coronarien aigu.

- risque accru de décès ou de réhospitalisation en raison d'un syndrome coronarien aigu (critère d'évaluation primaire combiné) chez les patients traités par le clopidogrel et un IPP (dans 59,7% des cas, il s'agissait de l'oméprazole)

**Figure.** Cumulative Risk of All-Cause Mortality and Recurrent Acute Coronary Syndrome (ACS) Among Patients Taking Clopidogrel After Hospital Discharge for ACS and Prescribed a Proton Pump Inhibitor (PPI) at Hospital Discharge or During Follow-up (n=5244)




- i-campus:

- article original à consulter (faits) ...
- avis du comité de pharmacovigilance de l'Agence Européenne du médicament

- mécanisme: peut-être une interaction dans la conversion d'une pro-drogue en son principe actif... (clopidogrel) ?

## IPP et risque cardiovasculaire (en cas de co-administration de clopidogrel)



- Clopidogrel bisulfate, a thienopyridine antiplatelet agent, is marketed worldwide and is used in the prevention of myocardial infarction, stroke and death in patients with acute coronary syndromes.
- The drug is not active *in vitro* and hepatic biotransformation is necessary to produce the platelet antiaggregating effect.
- Clopidogrel is primarily metabolized to an **inactive** carboxylic acid derivative, generated by hydrolysis, and to the **pharmacologically active metabolite** (AM) by a two-step cytochrome P450 (CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, **CYP2C19**) oxidation process via an inactive 2-oxoclopidogrel. Activity of the final product results from the presence of a **free thiol group** that irreversibly inhibits the binding of 2MeS-ADP to P2Y12 by **covalent binding to a cysteine** residue in the receptor through a disulfide bond.

Takahashi *et al.*, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2008; 48:1219-1224

# Protecteurs de la muqueuse gastrique

---

- bismuth (sous-nitrate et sous-citrate)
  - action essentiellement cicatrisante mais faible
  - effet anti-bactérien (*Helicobacter pylori*)
  - associé avec la ranitidine (citrate)
  - les doses élevées peuvent entraîner une encéphalopathie !
- sucralfate
  - disaccharide polysulfaté complexé à  $Al_2OH_5$
  - protecteur et cicatrisant
  - maintient un pH acide dans l'estomac (utilité [discutée] dans l'ulcère de stress chez le patient en décubitus pour éviter pneumonies bactériennes résultant de fausses déglutitions à partir d'un estomac non-stérile)
- misoprostol
  - analogue stable de la  $PGE_1$
  - permet de compenser l'inhibition de synthèse de prostaglandines protectrices de la muqueuse gastrique
  - cause de la diarrhée (stimulation des contractions intestinales) et des avortements (contre-indiqué en cas de grossesse)
  - peut être associé à un AINS non-sélectif (commerciallement avec le diclofénac).

# Antiacides de neutralisation


---

- bicarbonate et carbonate de  $\text{Na}^+$ 
    - agit rapidement mais de façon transitoire
    - provoque une surcharge en  $\text{Na}^+$ , une dilatation gastrique, de l'alcalose
  - hydroxydes et silicates de  $\text{Mg}^{++}$ 
    - effets plus prolongés
    - effets **laxatifs** marqués
  - hydroxydes d' $\text{Al}^{+++}$ 
    - action lente
    - causent de la **constipation**
- } parfois associés pour neutraliser leurs effets sur la motilité digestive

## Difficultés principales à l'usage des anti-acides

- nécessité de doses élevées pour être efficaces
  - attention au titre des préparations !!
- nécessité de prises régulières
  - mauvais contrôle de l'acidité nocturne
- interactions médicamenteuses potentielles importantes par modification de la biodisponibilité ( $\text{Mg}^{++}$ ,  $\text{Al}^{+++}$  [complexes]) et alcalinisation des urines (bicarbonates)
  - attention à tous les autres médicaments !!

**Figure 26.3** Mean gastric pH after a meal with or without antacid given 1 and 3 hours after meals. (From Sleisenger MH, Fordtran JS (Eds): *Gastrointestinal Diseases: Pathophysiology, Diagnosis, Management*. Philadelphia, W.B. Saunders, 1983, p717 with permission.)






Les antiacides de neutralisation n'ont qu'une durée d'action très limitée ...

# Modulateurs de la motilité (haute)


## Rappel de physiologie/anatomie

- oesophage:
  - péristaltisme induit par l'absorption des aliments
  - sphincter très puissant empêchant le reflux du contenu de l'estomac (acide !!)
- estomac
  - mouvements de brassage (non-synchrones)
  - mouvements de vidange (synchrones)
  - sphincter puissant empêchant le reflux du contenu duodénel (sels biliaires [ulcérogènes] !!) vers l'estomac et le passage intempestif d'acide vers le duodénum (ulcère !!)




<http://www.solvaypharma.ca/fr/areas/gastro2.asp>

# Contrôle de la contractilité œsophagienne et gastrique



# Actions pharmacologiques sur la contractilité œsophagienne et gastrique




# Agents procinétiques gastro-œsophagiens

---


- cholinomimétiques (carbachol, betnachol, ..)
  - abandonnés en raison des effets indésirables (bradycardie, diarrhée, sialorrhée, troubles de la vision)
- antagonistes dopaminergiques
  - **métoclopramide** (partiellement \*)
  - **dompéridone** (passe peu la barrière hémato-méningée)
- modulateurs sérotonergiques
  - **métoclopramide** (partiellement antagoniste 5HT<sub>3</sub>)
  - cisapride (antagoniste 5HT<sub>3</sub> - agoniste 5TH<sub>4</sub>)
    - restreint à certaines indications pour risque de torsades de pointes...

---


\* l'antagonisme D<sub>2</sub> provoque des effets extrapyramidaux et, parfois, de la galactorrhée en fonction de la dose et du passage de la barrière hémato-méningée




dopamine




halopéridol



sulpiride




métoclopramide




cisapride

sérotonine




Comment  
passer  
de D<sub>2</sub> à  
5HT<sub>3</sub>/5HT<sub>4</sub> ?


# Contrôle du vomissement et points d'action des médicaments antiémétiques




# Contrôle du vomissement et points d'action des médicaments antiémétiques




# Contrôle du vomissement et points d'action des médicaments antiémétiques



# Contrôle du vomissement et points d'action des médicaments antiémétiques



# Contrôle du vomissement et points d'action des médicaments antiémétiques



## Médicaments antiémétiques (sur base des mécanismes précédents)


---

- **antimuscariniques**
  - hyoscine (scopolamine)  
(en transdermal [importante toxicité systémique\*]; pas de spécialité en Belgique)
- **antidopaminergiques**
  - neuroleptiques (phénothiazines, butyrophénones): utilisés longtemps, mais risque d'effets indésirables (cfr. neuropharmacologie)
  - métoclopramide / dompéridone (action sur la cinétique gastro-œsophagienne; antagonisme 5HT<sub>3</sub> non sélective; faible action centrale) ...
- **antihistaminiques H<sub>1</sub>**
  - uniquement ceux à passage de la barrière hémato-méningée !
  - provoqueront de la sédation ...
- **antagonistes 5HT<sub>3</sub> sélectifs**
  - très puissants; peu d'effets indésirables
  - leur prix élevé les a fait réserver à des indications où eux seuls sont vraiment actifs (nausées et **vomissements postopératoires ou induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie**: en prévention ou en cas de plaintes importantes).

---

\* effets anticholinergiques classiques y compris les effets centraux (sommolence, confusion, vision trouble, sécheresse de la bouche, tachycardie, rétention urinaire (homme âgé), aggravation d'un glaucome à angle fermé, ...)

# Antagonistes 5HT<sub>3</sub> sélectifs (sétrons)





## Autres médicaments antiémétiques (1) ...


---

- **antagoniste des récepteurs à la neurokinine (substance P; NK1)**
  - les vomissements induits par les anticancéreux (**et** la morphine) sont médiés dans leur phase aiguë non seulement par la sérotonine mais aussi par la substance P
  - les antagonistes du récepteur NK1 améliorent la situation des patients pendant cette phase au cours d'un traitement anticancéreux...
  - premier produit commercialisé: l'aprépitant (sous forme de pro-drogue soluble)  
(en association avec un antagoniste 5HT<sub>3</sub> et un corticoïde – voir diapositives suivantes)
- **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine**
  - utiles dans la phase aiguë
- **corticoïdes**
  - mécanisme non précisé (prednisone / dexaméthasone utilisés en prévention des vomissements des anticancéreux)

# Substance P et aprépitant...




logP = 4.233  
logD<sub>pH7</sub> = 4.17




# Substance P et aprépitant...

- **Aprepitant:** aprepitant, ondansetron and dexamethasone on day 1; aprepitant and dexamethasone on days 2–3; dexamethasone on day 4)
- **control regimen:** ondansetron + dexamethasone on days 1–4).



**Figure 2.** Percentage of patients with no vomiting over 120 h post-cisplatin (Kaplan–Meier curves for time to first vomiting episode from start of cisplatin treatment in the overall phase).

de l'évidence clinique au remboursement



## Conditions de remboursement

[Aperçu d'impression](#)

Chapitre : IV

Sous-paragraphe : 3900000

La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée chez un bénéficiaire adulte ( $\geq 18$  ans) dans la prévention des nausées et des vomissements aigus et retardés, lors de cures de chimiothérapie comprenant un des cytostatiques suivants (dosé en  $\text{mg}/\text{m}^2$  surface du corps par jour, pleine dose, à moins qu'il n'y ait pas de mention spécifique):

a) soit cyclophosphamide IV  $> 1500 \text{ mg}/\text{m}^2$ , hexaméthylmelamine oral, carmustine =  $250 \text{ mg}/\text{m}^2$ , dacarbazine, streptozocine ou cisplatine =  $20 \text{ mg}/\text{m}^2$

b) soit une combinaison de cyclophosphamide =  $500 \text{ mg}/\text{m}^2$  avec une antracycline

La spécialité doit être administrée en association avec un antagoniste 5-HT<sub>3</sub> au jour 1 de la cure de la chimiothérapie, et avec un corticostéroïde du jour 1 au jour 4.

Le remboursement simultané de la spécialité avec un antagoniste 5-HT<sub>3</sub>, au-delà du premier jour de la cure, n'est jamais autorisé.

- Schmoll *et al.* Comparison of an aprepitant regimen with a multiple-day ondansetron regimen, both with dexamethasone, for antiemetic efficacy in high-dose cisplatin treatment. *Annals of Oncology* 17: 1000–1006, 2006 - doi:10.1093/annonc/mdl019

**disponible sur i-campus**

# Autres médicaments antiémétiques ...

---

- **érythromycine**

- était connue pour causer de l'intolérance gastrique par stimulation des contractions de l'estomac ...
- a été identifiée comme analogue non-peptidique de la motiline !
- utilisée à dose non-antibiotique (environ la moitié des doses actives conventionnelles) dans les paresthésies gastriques du diabétique ou post-vagotomie

- **cannabinoïdes**

- connus depuis longtemps pour leurs propriétés anti-émétiques
- effets indésirables (potentiels): euphorie, dysphorie, hallucinations, paranoïa, sédation, somnolence...)
- dérivés semi-synthétiques en développement (nabilone, ...) mais non-encore commercialisés en Belgique

- **anti-acides**

- utiles dans les nausées / vomissements simples
- attention aux effets indésirables et interaction avec les autres médicaments à prise orale...

