

Toxicomanie et dépendances



Hermans FARM2129 - 55

LA TOXICOMANIE

Organisation Mondiale de la Santé :

« Un syndrome pour lequel la consommation d'un produit devient une exigence supérieure à celle d'autres comportements qui avaient auparavant une plus grande importance »

État de dépendance **physique** et **psychique** à un produit agissant sur le système nerveux central qui entraîne :

- une accoutumance
- une déchéance pouvant aller jusqu'à la mort.

Hermans FARM2129 - 56

DIFFERENTS TYPES DE DROGUES

En fonction de l'effet recherché par le toxicomane

- LES STIMULANTS

- caféine
- nicotine
- amphétamines (ecstasy)
- cocaïne et crack

- LES SEDATIFS

- tranquillisants
- anxiolytiques
- alcool
- méthadone
- opium : codéine
morphine
héroïne
- solvants : éther
colle
trichloréthylène

- LES HALLUCINOGENES

- cannabis (marijuana et haschich)
- L.S.D.
- PCP (Angel dust)

DIFFERENTS TYPES DE DROGUES


En fonction de l'effet recherché par le toxicomane

Type	Examples	Dependence liability
Narcotic analgesics	Morphine	Very strong
	Diamorphine	Very strong
General CNS depressants	Ethanol	Strong
	Barbiturates	Strong
	Methaqualone	Moderate
	Glutethimide	Moderate
	Anaesthetics	Moderate
	Solvents	Strong
Anxiolytic drugs	Benzodiazepines	Moderate
Psychomotor stimulants	Amphetamines	Strong
	Cocaine	Very strong
	Caffeine	Weak
	Nicotine	Very strong
Psychotomimetic agents	LSD	Weak or absent
	Mescaline	Weak or absent
	Phencyclidine	Moderate
	Cannabis	Weak or absent

Dépendance :

État d'adaptation à une substance provoquant des signes ou des symptômes dans les heures et les jours qui suivent l'arrêt de la consommation (*sevrage*).

- Dépendance physique : manifestations physiques du sevrage : larmoiements, douleurs, dilatation pupillaire, transpiration, diarrhée, insomnie, hypertension (pour les opiacés); agitation, tachycardie, tremblements, hallucinations, crises d'épilepsie (pour l'alcool); somnolence (pour les amphétamines); maux de tête (pour le café); etc.
- Dépendance psychique (*addiction*) est caractérisée par une pulsion psychologique fort puissante à absorber continuellement le produit et/ou une présence d'angoisse à s'en trouver privé (manque / *craving*).




Hermans FARM2129 - 59

Les voies de la récompense (de la motivation)

Stimuli
activateurs →

- Nourriture
- Boissons
- Sexualité
- Relations sociales



Hermans FARM2129 - 60

Les voies de la récompense (de la motivation)


Pathologies des voies de la récompense

Trouble de la motivation :
le trouble d'hyperactivité avec
déficit de l'attention (THADA)
‘ les enfants hyperkinétiques ’

R/ rilatine (méthylphénidate)

Hermans FARM2129 - 61

Les voies de la récompense (de la motivation)



Pathologies des voies de la récompense


Trouble de la motivation :
le trouble d'hyperactivité avec
déficit de l'attention (THADA)
‘ les enfants hyperkinétiques ’

R/ rilatine (méthylphénidate)



Hermans F.


Modification persistante de l'activité neuronale



Diminution de l'expression du transporteur de la dopamine chez un patient exposé pendant 80 jours à la méthamphétamine

Hermans FARM2129 - 63

Toutes les substances qui conduisent à une dépendance psychique modulent positivement la transmission dopaminergique dans le noyau accumbens.



Hermans FARM2129 - 64

Complément pharmacologique à la prise en charge médicale des dépendances.

Deux composantes :

1. Traitement symptomatique du sevrage
2. Traitement de la dépendance psychique (dissocier le conditionnement de l'effet)

- Thérapie de substitution (soulage le sevrage) : nicotine, méthadone, benzodiazépines
- Antagonistes (inhibition 'brutales') : mecamlamine, naltrexone, immunisation
- Approches métaboliques (disulfirame)
- Autres : antidépresseurs, bupropion, acamprosate

Hermans FARM2129 - 65

La prise en charge des toxicomanies...



...un paradoxe pharmacodynamique



Methadone





Tabagisme

- Manifestations physiques du sevrage = 2-3 semaines
- Persistance du désir (psychique) = mois, années...

- Remarque : réussite limitée
 - Sans soutien psycho/pharmacologique : 95-98 % de rechute à 1 an.
 - Avec soutien pharmacologique seul : 95-98 % de rechute à 1 an.
 - Avec soutien psychologique ET pharmacologique : **75 %** de rechute à 1 an

- Substitution



!!129 - 67

- Bupropion (amfébutamone)



Tabagisme

- Substitution : Nicotine

1 cigarette normale = 0,8 à 1,5 mg nicotine

1 fumeur moyen = 15 cigarettes/jour

- patches transdermiques (7, 14 ou 21 mg/24h)
- gommes à mâcher (2-4 mg)
- Inhaler (5-25 mg/24h)



- Diminue les manifestations du sevrage
- Effets secondaires : vertiges, nausées, palpitations
- Irritations cutanées (patches)
- Pas d'associations de deux approches
- Pas de tabac!!!



!!129 - 68



Tabagisme



- Amfébutamone (Zyban[®]) = Bupropion
Antidépresseur (inhibe recapture
Noradrénaline et dopamine)
Traitements de 7-10 semaines
- Mecamylamine
Antagoniste des récepteurs nicotiniques
(pas en Belgique)



1129 - 69

La varénicline (Champix) : agoniste partiel des récepteurs nicotiniques

Agoniste partiel : - assure la substitution
- diminue les sensations de la consommation

The screenshot shows the FDA website header with the '1906-2006 FDA Centennial' logo and the 'U.S. Food and Drug Administration' title. Below the header are navigation links: 'FDA Home Page', 'Search FDA Site', 'FDA A-Z Index', 'Contact FDA', and 'FDA Centennial'. The main section is titled 'FDA News' and contains a press release dated May 11, 2006. The release is for 'IMMEDIATE RELEASE' and mentions 'P06-67'. It states that the FDA has approved Chantix (varenicline tartrate) tablets for smoking cessation. The active ingredient is varenicline tartrate, a new molecular entity that received a priority FDA review due to its potential benefit to public health. Media inquiries are directed to Laura Alvey at 301-827-6242, and consumer inquiries to 888-INFO-FDA.

1906-2006 FDA Centennial

U.S. Food and Drug Administration

[FDA Home Page](#) | [Search FDA Site](#) | [FDA A-Z Index](#) | [Contact FDA](#) | [FDA Centennial](#)

FDA News

FOR IMMEDIATE RELEASE
P06-67
May 11, 2006

FDA Approves Novel Medication for Smoking Cessation

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) announced today the approval of Chantix (varenicline tartrate) tablets, to help cigarette smokers stop smoking. The active ingredient in Chantix, varenicline tartrate, is a new molecular entity that received a priority FDA review because of its significant potential benefit to public health.

Media Inquiries:
Laura Alvey, 301-827-6242
Consumer Inquiries:
888-INFO-FDA




1129 - 70

Alcoolisme




- Traitements :
- Substitution : Benzodiazépines (diazépam, demi-vie longue)
- Symptomatique du sevrage : clonidine, Beta bloquants, neuroleptiques (tiapride)
- Complément : Acamprosate (analogue de la Taurine, antagoniste du récepteur NMDA du glutamate)
- Inhibition de son métabolisme hépatique : Disulfirame (antabuse^R)



Disulfirame ou comment transformer l'alcool en un poison

Accumulation
= nausées,
bouffées de
chaleur,
transpiration,...



Disulfirame ou
comment
transformer
l'alcool en un
poison

