FARM2133

Anti-tumoraux

Prof. O. Feron
(olivier.feron@uclouvain.be)

1

Rappel.

Chiffres 2008 en Belgique (dévoilés en 2011):

- ✓ 59.996 nouv. diagnostics
 - ~1 homme sur 3
 - ~1 femme sur 4
 - donc 1 diagnostic / 10 min
- ✓ 26.647 décès
 - 15.095 hommes
 - 11.552 femmes
 - donc 1 décès / 20 min

2

Rappel.

Figure 5 The ten most frequently occurring tumours by sex, Belgium 2008

I. Cancer - définitions

Cancer = maladie génétique auto-adaptative

mutations, amplification, translocation, ...
suite à l'action de carcinogènes (chimiques ou viraux)

- activation de proto-oncogènes en oncogènes (#100)
... généralement régulant la prolifération cellulaire
ex: ras
- inactivation de gènes suppresseurs de tumeur ou de « stabilité génomique » (#30)
... généralement régulant l'apoptose
ex: p53

**conférant aux cellules transformées
des avantages en termes
de prolifération et de survie**

Cancer = maladie génétique auto-adaptative

- angiogenèse
(formation de nouveaux vaisseaux sanguins)
- adaptation métabolique
(switch glycolytique ou effet Warburg)

permet de s'adapter à l'hypoxie/ischémie respectivement :

- en favorisant un apport nouveau en nutriments et oxygène
- en dépendant moins de la respiration mitochondriale

5

II. Caractéristiques des cellules tumorales **→ implications pour la chimiothérapie**

- 1) Prolifération incontrôlée:

'Absence de contrôle' et non pas 'plus grande vitesse de division' !!

En effet, certaines cellules saines ne se divisent pas (neurones)
mais d'autres se divisent vite (moëlle osseuse, épithélium gastrointestinal).

cfr oncogènes et perte de gènes suppresseurs de tumeurs « dérégulant »
le cycle cellulaire (en stimulant la prolifération et réduisant l'apoptose)

6

Le cycle cellulaire:

7

Implications pour la chimiothérapie « antiproliférative »:

Le taux de cellules engagées dans le cycle cellulaire est plus élevé dans les tumeurs que dans les tissus sains et donc ...

- le nombre de cellules cancéreuses « tuées » par la chimiothérapie est plus élevé que dans la majorité des tissus sains
- le potentiel de réparation après une chimiothérapie est plus important dans les tissus sains

8

- 2) Dédifférenciation:

La division d'une cellule souche aboutit à la formation d'un tissu doté de fonctions déterminées résultant de la différenciation cellulaire

Une cellule tumorale est peu différenciée, voire résulte d'une dédifférenciation; d'où le statut prolifératif de nombreux cancers.

Un traitement qui tue 99,99% des cellules tumorales réduit la tumeur de quatre ordres logarithmiques. En considérant une tumeur moyenne comprenant 10^{11} cellules, il en restera encore 10^7 après le traitement !!

Des protocoles de **traitements répétés** doivent être mis en place pour espérer définitivement éradiquer une tumeur (note: ceci est différent des antibiotiques où le système immunitaire peut prendre le relais en-dessous d'un certain seuil d'infection)

9

- 3) Invasivité - Métastatisation

Une cellule saine d'un tissu spécialisé reste confinée à ce tissu. Des facteurs de survie spécifiques (anti-apoptotiques) assurent la survie cellulaire; en cas d'échappement, la cellule « égarée » est vouée à mourir.

Une cellule tumorale perd cette contrainte de confinement; la production de protéases matricielles favorise d'ailleurs la migration dans les tissus voisins et l'expression de certains antigènes promeut préférentiellement la métastatisation dans certains organes périphériques.

La chimiothérapie est la seule arme contre un cancer disséminé (par opposition à la radiothérapie et la chirurgie).

10

III. Principaux médicaments utilisés en chimiothérapie du cancer

- Médicaments cytotoxiques
= chimiothérapie conventionnelle
- Mabs (anticorps monoclonaux)
- Inibs (« small molecules »)
- Inhibiteurs du protéasome, de mTOR, ...

11

Hormonothérapie

III. 1. Anti-tumoraux cytotoxiques:

1. Alkylants et analogues (liens covalents au niveau de l'ADN)
2. Antimétabolites (inhibent les voies de synthèse de l'ADN)
3. Antibiotiques anti-tumoraux (entravent la réplication)
4. Inhibiteurs de topo-isomérases (bloquent la réplication)
5. Inhibiteurs des microtubules (bloquent la mitose)

12

1. Agents alkylants

- contiennent des groupements chimiques capables de former des liens covalents avec des substances nucléophiles (amine, OH, SH) [dans l'ADN, l'azote en position 7 de la guanine (N7) est la cible majeure]

Principales conséquences:

- formation de ponts intra- et intercaténares (car svt bi-fonctionnels)
 - excision de N7 avec cassure de la chaîne
 - appariement incorrect avec une thymine plutôt qu'une cytosine
- action majeure en phase S (lq les 2 brins d'ADN sont désappariés) avec blocage consécutif en G2

13

Agents alkylants - types

- moutardes azotées
cyclophosphamide*,
melphalan, chlorambucil, ...

- nitrosourées
(liposolubles)

- dérivés du platine
(cis- et carboplatine)

14

Agents alkylants - mécanisme

15

Agents alkylants – le cyclophosphamide (Endoxan™)

cystite hémorragique

16

2. Anti-métabolites

- antagonistes de l'acide folique
 - méthotrexate
- analogues des pyrimidines
 - fluorouracil
 - cytarabine
 - gemcitabine
 - ...
- analogues des purines
 - fludarabine
 - mercaptopurine
 - ...

17

Antagoniste de l'acide folique: le methotrexate

L'acide folique est essentiel pour la synthèse des nucléotides, il est activement capté par les cellules et converti en polyglutamates

Analogues des pyrimidines (C, T, U)

- Fluorouracil = analogue de l'uracil (précurseur de la 2'-deoxythymidine)
- Cytarabine = analogue de la 2'- déoxycytidine

Analogues des purines (A, G)

- Fludarabine = analogue de l'adénosine

18

Anti-métabolites: mécanismes

3. Antibiotiques anti-tumoraux

- anthracyclines (doxorubicine et analogues) et dactinomycine = agents intercalants et inhibiteurs de la topoisomérase II
- bléomycine = chélateur du fer et formation ROS via interaction avec l'O₂, favorisant des cassures de l'ADN
- mitomycine (= agent alkylant)

4. Inhibiteurs de topoisomérase

- Inhibiteurs de la topoisomérase I (irinotecan, topotécan)
- Inhibiteurs de la topoisomérase II (étoposide)

21

Inhibiteurs de topoisomérases: mécanisme

Activité topoisomérase = introduction transitoire d'une coupure dans l'ADN pour permettre la rotation d'un brin sur l'autre et éviter la torsion de l'ADN au cours de la réplication.

Les inhibiteurs pharmacologiques des topoisomérases empêchent la religature du brin coupé; il s'en suit une cassure définitive de l'ADN.

22

5. Inhibiteurs des microtubules

☐ Alcaloïdes de la pervenche (Vinca Rosea)

- vincristine
- vinblastine

☐ Taxanes (Taxus)

- paclitaxel
- docétaxel

23

Inhibiteurs des microtubules: mécanismes

Les microtubules résultent de la polymérisation de dimères de tubuline. Présents dans l'ensemble des cellules eucaryotes, ils constituent des structures dynamiques, constamment en cours de polymérisation et de dépolymérisation.

Les inhibiteurs des microtubules exercent leurs effets anti-tumoraux en altérant le fuseau pendant la division cellulaire.

Les alcaloïdes de la pervenche bloquent la polymérisation alors que les taxanes empêchent la dépolymérisation.

24

En résumé:

1. Alkylants et analogues (liens covalents au niveau de l'ADN)
2. Antimétabolites (inhibent les voies de synthèse de l'ADN)
3. Antibiotiques anti-tumoraux (entravent la réplication)
4. Inhibiteurs de topo-isomérases (bloquent la réplication)
5. Inhibiteurs des microtubules (bloquent la mitose)

25

Effets secondaires de la chimiothérapie conventionnelle :

- rapides
- précoces
- retardés

	Effets indésirables	Alkylants	Antimétabolites	Antibiotiques	Inhib. Topo-isomérases	Inhib. microtubules
R a p i d e s	Nausée-vomissements	+ : Cyclophos - Platines	+ : métho			
	Toxicité GI		+ : 5FU		+ : irinotécan (diarrhée)	+ : vinca (constip)
	Toxicité veineuse			+ : doxo	+ : étoposide	+ : vinca
	Hypersensibilité (fièvre, prurit, ...)					+ : taxanes
	Néphro- et urotoxicité	+ : Cisplatine + : Cyclophos: (cystite hémorragique)	+ : métho			
	Hépatotoxicité		+ : métho			

26

	Effets indésirables	Alkylants	Antimétabolites	Antibiotiques	Inhib. Topoisomérases	Inhib. microtubules
P r é c o c e s	Myélotoxicité (leucopénie, thrombopénie, anémie)	+ : Platines, Cyclophos		Anthracyclines> Bléomycine (très peu myélotox)	+ : étoposide	Taxanes> Vinca (peu myélotox)
	Atteinte du système immunitaire					
	Asthénie					
	Mucite	+ : Cyclophos	+ : 5-FU, métho	+ : anthra		+ (taxanes)
	Alopécie	+ : cyclophos		+ : anthra	+ : topotécan	+ : taxanes

27

	Effets indésirables	Alkylants	Antimétabolites	Antibiotiques	Inhib. Topoisomérases	Inhib. microtubules
R e t a r d é s	Cardiomyopathies			dysrythmies, insuffisance cardiaque, infarctus		
	Fibrose pulmonaire	+ : Busulfan		+ : Bléomycine (10% patients)		
	Neurotoxicité	+ : Platines	+ : Capecitabine : (syndrome mains- pieds)			+ : Vinca (paresthésie) et Taxanes
	Infertilité, effets mutagènes et tératogènes					

28

	Effets indésirables	Alkylants	Anti métabolites	Antibiotiques	Inhib. Topo- isomérases	Inhib. microtubules
R a p i d e s	Nausée/vomissements	+ : Cyclophos - Platines	+ : métho			
	Toxicité GI		+ : 5FU		+ : irinotécan (diarrhée)	+ : vinca (constip)
	Toxicité veineuse			+ : doxo	+ : étoposide	+ : vinca
	Hypersensibilité (fièvre, prurit, ...)					+ : taxanes
	Néphro- et urotoxicité	+ : Cisplatine + : Cyclophos: (cystite hémorragique)	+ : métho			
	Hépatotoxicité		+ : métho			
P r é c o c e s	Myélotoxicité (leucopénie, thrombopénie, anémie)	+ : Platines, Cyclophos		Anthracyclines> Bléomycine (très peu myélotox)	+ : étoposide	Taxanes> Vinca (peu myélotox)
	Atteinte du système immunitaire					
	Asthénie					
	Mucite	+ : Cyclophos	+ : 5-FU, métho	+ : anthra		+ (taxanes)
	Alopécie	+ : cyclophos		+ : anthra	+ : topotécan	+ : taxanes
R e t a r d é s	Cardiomyopathies			dysrythmies, insuffisance cardiaque, infarctus		
	Fibrose pulmonaire	+ : Busulfan		+ : Bléomycine (10% patients)		
	Neurotoxicité	+ : Platines	+ : Capecitabine : (syndrome mains- pieds)			+ : Vinca (paresthésie) et Taxanes
	Infertilité, effets mutagènes et tératogènes					

III. 2. Mabs (anticorps monoclonaux):

III. 3. Inibs (small molecules):

Anticorps "Mabs"	Nom déposé	Antigènes	Cibles	Indications (reconnues en Belgique)	Remarques
Bevacizumab	Avastin	VEGF (vascular endothelial growth factor)	Cellules endothéliales angiogéniques	cancers colorectal et mammaire métastasés; cancers pulmonaire et rénal	association à une chimiothérapie
Trastuzumab	Herceptin	HER-2 (facteur de croissance Neu)	Cellules tumorales	Cancer du sein métastaté avec surexpression de HER-2 Cancer de l'estomac	aussi traitement précoce de certains cancers du sein non métastasés avec surexpression de HER-2
Cetuximab Panitumumab	Erbitux (IgG1) Vectibix (IgG2)	EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique)	Cellules tumorales	cancer colorectal métastaté et carcinome épidermoïde de la tête et du cou.	
Alemtuzumab	Mabcampath	CD52	lymphocytes B et T	leucémies lymphoïdes chroniques	
Rituximab	Mabthera	CD20	lymphocytes B	lymphomes, en cas d'échec de la chimiothérapie,	aussi dans l'arthrite rhumatoïde résistante aux autres inducteurs de rémission
Ibritumomab tiuxétan	Zevalin	CD20 !! marquage à l'yttrium-90 !!	lymphocytes B	lymphomes non hodgkiniens chez l'adulte après traitement par le rituximab.	
Ipilimumab	Yervoy	CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4)	Lymphocytes T	mélanome non-réséquable ou métastatique	en inhibant CTLA-4, ipilimumab stimule le système immunitaire 31

Trastuzumab

Bevacizumab

Rituximab

Trastuzumab	Herceptin	HER-2	Cellules tumorales	Cancer du sein métastaté avec surexpression de HER-2 Cancer de l'estomac
Cetuximab Panitumumab	Erbix Vectibix	EGFR	Cellules tumorales	cancer colorectal métastaté et carcinome épidermoïde tête et cou

Cancer du sein: 15-20% expriment Her2/Neu (1500 en Belgique par an)

... cancer du sein avancé

En Belgique ...
40.000 € pour 52 doses (= 1 an)

40.000 € x 1500 patientes =
60.000.000 € par an

- Limiter aux stades précoces de la maladie
- Réduire la fréquence des administrations

... cancer du sein précoce, post-chirurgie

Bevacizumab	Avastin	VEGF (vascular endothelial growth factor)	Cellules endothéliales angiogéniques	cancers colorectal et mammaire métastasés; cancers pulmonaire et rénal	association à une chimiothérapie
--------------------	----------------	---	--------------------------------------	---	----------------------------------

Cell 1997

ORIGINAL ARTICLE
 Volume 350:2335-2342 June 3, 2004 Number 23
Bevacizumab plus Irinotecan, Fluorouracil, and Leucovorin for Metastatic Colorectal Cancer
 Herbert Harnett, M.D., Louis Fehrenbacher, M.D., William Novotny, M.D., Thomas Curtwright, M.D., John Hanover, M.D., William Hein, M.D., Jordan Berlin, M.D., Ari Baron, M.D., Susan Orloff, B.S., Eric Holsinger, Ph.D., Napoleone Ferrara, M.D., Owen Fyfe, M.D., Beth Rogers, B.S., Robert Ross, M.D., and Patrick Kabbinavar, M.D.

Genentech
 IN BUSINESS FOR LIFE

IMPORTANT DRUG WARNING

Dear Healthcare Provider:

It is important that Genentech, Inc. informs you of updated serious adverse event information related to the use of AVASTIN™ (Bevacizumab). Specifically, there is evidence of an increased risk of serious arterial thromboembolic events including cerebrovascular accidents (stroke), myocardial infarctions, transient ischemic attacks, and angina, related to the use of AVASTIN. The risk of fatal arterial thrombotic events is also increased. Patients who experience an arterial thromboembolic event during treatment should permanently discontinue AVASTIN. In randomized, active-controlled studies conducted in patients with metastatic colorectal cancer, the risks of a serious arterial thrombotic event was approximately two-fold higher in patients receiving infusional 5-FU based chemotherapy plus AVASTIN, with an estimated overall rate of up to 5%. Risk factors for the development of arterial thromboembolic events included a history of arterial thromboembolism prior to AVASTIN exposure, age 65 years and above, and AVASTIN therapy. These events occur at a higher rate in these high-risk groups.

WARNINGS
Gastrointestinal Perforations/Wound Healing Complications Avastin administration can result in the development of gastrointestinal perforation and wound dehiscence, in some instances resulting in fatality. Gastrointestinal perforation, sometimes associated with intra-abdominal abscess, occurred throughout treatment with Avastin (ie, was not correlated to duration of exposure). The incidence of gastrointestinal perforation in patients receiving bolus-IFL with Avastin was 2%. The typical presentation was reported as abdominal pain associated with symptoms such as constipation and vomiting. Gastrointestinal perforation should be included in the differential diagnosis of patients presenting with abdominal pain on Avastin. Avastin therapy should be permanently discontinued in patients with gastrointestinal perforation or wound dehiscence requiring medical intervention. The appropriate interval between termination of Avastin and subsequent elective surgery required to avoid the risks of impaired wound healing/wound dehiscence has not been determined. (See **WARNINGS** and **DOSAGE AND ADMINISTRATION** sections of the full Prescribing Information.)

Hemorrhage Serious, and in some cases fatal, hemoptysis has occurred in patients with non-small cell lung cancer treated with chemotherapy and Avastin. In a small study, the incidence of serious or fatal hemoptysis was 31% in patients with squamous histology and 4% in patients with adenocarcinoma receiving Avastin as compared to no cases in patients treated with chemotherapy alone. Patients with recent hemoptysis should not receive Avastin. (See **WARNINGS** and **DOSAGE AND ADMINISTRATION** sections of the full Prescribing Information.)

Cancer Cell
Minireview
Silencing or Fueling Metastasis with VEGF Inhibitors: Antiangiogenesis Revisited

« Inibs »	Nom déposé	Cibles (protéine tyrosine kinase)	Cancer
Imatinib	Glivec	bcr/abl c-Kit) PDGFR	leucémie myéloïde chronique tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST)
Dasatinib Nilotinib	Sprycel Tasigna	bcr/abl (Src)	leucémie myéloïde chronique (résistante à l'imatinib)
Lapatinib	Tyverb	HER2/neu	cancer du sein avancé ou métastasé
Gefitinib	Iressa	EGFR-1	cancer bronchique non à petites cellules (NSCLC),
Erlotinib	Tarceva	EGFR-1	cancer bronchique non à petites cellules (NSCLC), cancer du pancréas
Sorafenib	Nexavar	VEGFR2 (Raf Kinase, PDGFR, c-Kit)	carcinome rénal métastasé, cancer du foie
Sunitinib	Sutent	VEGFR2 (PDGFR, c-Kit)	tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) cancer du rein avancé et/ou métastasé
Pazopanib	Votrient	VEGFR-1,2,3, PDGFR, c-kit.	cancer du rein avancé
Pazopanib	Votrient	VEGFR-1,2,3, PDGFR, c-kit.	cancer du rein avancé
Olaparib , Iniparib, Veliparib	---	PARP (DNA repair enzyme)	cancer des ovaires ³⁷ associé à mutations BRCA1 et 2

Imatinib	Glivec	bcr/abl c-Kit PDGFR	leucémie myéloïde chronique tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST)
----------	--------	---------------------------	--

**Gleevec®
(imatinib mesylate)**

Sorafenib	Nexavar	VEGFR2 (Raf Kinase, PDGFR, c-Kit)	carcinome rénal métastasé, cancer du foie
Sunitinib	Sutent	VEGFR2 (PDGFR, c-Kit)	tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) cancer du rein avancé et/ou métastasé
Pazopanib	Votrient	VEGFR-1,2,3, PDGFR, c-kit.	cancer du rein avancé
Pazopanib	Votrient	VEGFR-1,2,3, PDGFR, c-kit.	cancer du rein avancé

III. 4. Autres anti-tumoraux

- inhibiteur du protéasome: **bortezomib** (Velcade) (exerce indirectement des effets pro-apoptotiques et inhibe la croissance cellulaire)

- inhibiteurs de mTOR :
temsirolimus (Torisel),
everolimus (Afinitor)
et d'autres voies signalétiques ...

III. 5. Hormonothérapie

Voir le cours du Prof. JC Jonas