



MODULATEURS DU SRAA:


- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'Angiotensine (IECA)
- Antagonistes de l'Angiotensine (Sartans)
- Inhibiteur de la rénine



1




Rôles physiologiques et modulation pharmacologique du SRAA (1/2).




3

Rôles physiologiques et modulation pharmacologique du SRAA (2/2).




en présence d'un IEC



« ↓ AngII » s'atténue lors d'un traitement chronique (idem ↓ Aldo)

- suite à l'accumulation de Ang I qui permet de surmonter l'inhibition
- suite à l'action d'autres enzymes (chymases) insensibles aux IEC

en présence d'un Sartan



↑ AngII, ne permet pas de surmonter l'inhibition du réc. AT₁ mais forte stimulation du réc. AT₂ (peut-être cardioprotecteur?)

« Evidence-based Medicine »:

- sartans, ni inf. ni sup. aux IEC
- pas d'effets additifs sartan + IEC

DCI (Spécialités B, CH, F)	Pro-médicaments*	Concentration plasmatique maximale (h)	Biodisponibilité (%)	Demi-vie plasmatique** (h)	Dose (mg) quotidienne moyenne <i>per os</i> (mg) (nombre de prises)	Élimination rénale	Élimination biliaire
captopril \$ (Capoten B; Lopirin, Tensobon CH; Captolane, Lopril F)	-	0.5-1.5	70	2	25-100 (1-3)	+	-
énalapril (Renitec B, F; Reniten CH)	+	1	40	11	10-20 (1-2)	+	-
bénazépril (Cibacen(e) CH, F; Briem F)	+	0.5-1.5	37	10-25	10-20 (1-2)	+	+
cilazapril (Inhibace B, CH; Justor F)	+	1	52	1.5-2	2.5-5 (1-2)	+	-
fosinopril (Fosinil B; Fositen CH; Fositec F)	+	3	25	4	10-20 (1)	+	+
lisinopril (Zestril B, CH, F; Novatec B; Prinil CH; Prinivil F)	-	7	25	12	10-20 (1-2)	+	-
périndopril (Coversyl B, F; Coversum CH)	+	8	40-55	9	4-8 (1-2)	+	-
quinapril (Accupril B; Accupro CH; Acuitel, Korec F)	+	1.5	75-80	2-3	10-40 (1-2)	+	-
ramipril (Triatec CH, F; Ramace, Tritace B; Vesdil CH)	+	0.3-1	55-65	11-27	2.5-10 (1-2)	+	+
spirapril (Cardiopril CH)	+	2-3	40	30-40	6 (1)	+	+
trandolapril (Gopten CH, F; Qdrik F)	+	4-6	10	16-24	2-4 (1-2)	+	+


* Les pro-médicaments se présentent sous la forme d'un ester rapidement absorbé par le tractus digestif. Cet ester a besoin, pour devenir actif, d'être hydrolysé au niveau hépatique.

** Valeur correspondant au métabolite actif pour les inhibiteurs de type pro-médicament.

\$ Captopril: rapidité d'action ⇒ indiqué dans la crise hypertensive

\$\$ Lq élimination biliaire: maintien de la posologie jusqu'à filtr. glom. de 30ml/min

« Sartans »



(voir cours RSA)

7

Effets des IECA et Antag. AT1:

- effets **vasculaires** par ↓ résistance périphérique visible si stimulation SRAA par un régime désodé ou administration d'un diurétique (en fait, peu d'effets sur sujets normotendus (normosodés))

- pas d'effets sur fréquence cardiaque via activation réflexe (cfr effets sympatholytiques)
- limitation de l'hyperplasie/hypertrophie pariétale vasculaire

⇒ indication: **Hypertension (+ Infarctus et Post-infarctus*)**

- effets **cardiaques** par ↓ post- et pré-charges suite à (i) vasodilatation, (ii) limitation de l'activité sympathique et (iii) diminution de l'aldostérone

- limitation du remodelage ventriculaire (↓ masse ventriculaire et ↓ fibrose)
- effets encore accentués si associés à spironolactone; cfr dépassement de l'inhibition avec le temps (attention toutefois à l'hyperkaliémie)

⇒ indication: **Insuffisance cardiaque (+ Infarctus et Post-infarctus*)**

8


Infarctus

(traitement initié dans les 24h)

ACE INHIBITORS

Dzau-Braunwald model

Post-infarctus*



- effets **sympatholytiques** par ↓ libération des catécholamines par la médullosurrénale et au niveau présynaptique par les fibres sympathiques post-ganglionnaires

⇒ indication: **Hypertension et Insuffisance cardiaque**

- ↑ **flux sanguin rénal** et ↓ pression intraglomérulaire (par vasodilation de l'artériole efférente)

⇒ ↓ albuminurie

⇒ protection contre les lésions (associées à l'hypertension artérielle et évolutives au cours du diabète)

⇒ indications: **Néphropathies diabétiques hypertensives**
Insuffisance rénale naissante

9

Effets secondaires:

- Toux suite à l'accumulation de peptides tussigènes (BK, substance P) apparaissant parfois après plusieurs semaines
⇒ IEC mais pas (ou peu) avec les Antag. AT1
- Augmentation de la kaliémie (cfr. effets sur aldostérone)
- Hypotension chez les malades déplétés en sel, en particulier insuffisants cardiaques traités avec un diurétique de l'anse (par précaution, arrêter les diurétiques pendant quelques jours à l'instauration du traitement)
- Insuffisance rénale aiguë par vasodilation art. effér. et risque d'hypoperfusion (mais uniquement si sténose bilatérale des artères ... afférentes)
- Dysgueusie (IEC)
- Oedèmes angioneurotiques rares mais pronostic vital

Contre-indications:

- **grossesse ou projet de grossesse** (défaut sévère de maturation de certains organes du fœtus)

Précautions:

- association avec des diurétiques de l'épargne potassique ou des suppléments de potassium

Depuis avril 2008 ...

Inhibiteur de la rénine: [aliskirène] Rasilez

Posol. 150 mg, éventuellement jusqu'à 300 mg p.j. en 1 prise (effet soutenu pdt 24h)

Les inhibiteurs de la rénine agissent, comme les IECA et les sartans, sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Aucun effet sur la mortalité n'a pour le moment été démontré avec les inhibiteurs de la rénine.

Indications

Hypertension.

Effets indésirables principaux

Troubles gastro-intestinaux (entre autres diarrhée).


Eruptions cutanées.

Oedème angio-neurotique: !! plusieurs cas rapportés

Contre-indications:

Grossesse

11



- ✓ riposte homéostasique à l'action immédiate des diurétiques
- ✓ IECA et diurétiques hyperkaliémants contre-indiqués
- ✓ intérêt de l'association diurétiques hypokaliémants et IECA
- ✓ IECA sympatholytiques: indic. pour hypertens. et insuff. card.
- ✓ β-bloq. = IECA indirects: indic. hypertens. et insuff. card.
- ✓ antag. Ca: chez la personne âgée/afric. où les taux rénine sont bas

12