

Soins Pharmaceutiques: Première délivrance d'un médicament

HERPES ZOSTER et douleurs post-herpétiques

Projet pédagogique développé par

- la *Katholieke Universiteit Leuven*
 - l'Université catholique de Louvain
- en collaboration avec **multi**PHARMA 

E. Ampe, Pharm., P. Evrard, Dr Sc. Pharm., G. Laekeman, Dr Sc. Pharm.,
P.M. Tulkens, Dr Med., F. Van Bambeke, Dr Sc. Pharm.



Présentation du cas du Patient: Mr. Rash

Mr. Rash, 61 ans, vous explique:

J'ai des brûlures (*"comme du papier de verre..."*) au niveau du dos
et *"courant le long des côtes depuis la colonne vertébrale..."*

- Le médecin m'a prescrit un anti-douleur... et un autre médicament que je ne comprends pas très bien ...
- Non, je ne prends pas d'autres médicaments...
- Oui, je fume (un demi paquet/jour) ...
et oui, je prend mes deux ou trois verres de vin tous les soirs...



Première délivrance: Mr. Rash

Monsieur Rash vient à votre pharmacie avec l'ordonnance suivante:

Pourquoi ?

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
	Cachet du pharmacien au verso
	Exécuté le :
REPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR:	
Nom et prénom du patient:	7. Rash
(Souligner la mention adéquate)	
Réservé à la vignette du conditionnement	R/ Aciclovir 800 mg 35 co. S/ 5 x/jour R/ Nimesulide 100 mg 2 x/jour
Cachet du prescripteur	Date et signature du prescripteur Dr A. V.



Présentation du cas du Patient 1: Mr. Rash

Si vous lui demandez quelle est la cause de la douleur, il vous répond qu'il a une "drôle de plaque rouge au dos, à l'endroit de la douleur et qui suit *"comme une ligne depuis la colonne..."*"






Lésions du Zona ...

Vésicules en grappes sur fond erythémateux





Le Zona peut également atteindre le visage



OBJECTIFS


- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - comment l'employer ?
 - Information complémentaire ..

OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...


- Connaissance ?
 - **physiopathologie**
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - comment l'employer ?
 - Information complémentaire ...



Varicella zoster: physiopathologie

Virus Varicella Zoster *	
pathogénicité	syst. respiratoire ↳ syst. Lymphatique et sanguin ↳ syst. réticulo-endothélial ↳ peau → VARICELLE : primo-infection
transmission	• contact • aérosol Incubation: 10-20 jours virémie: 4-5 j
latence	• ganglions neuronal → ZONA : réactivation

* Virus de la famille Herpes (HSV-1, HSV-2, CMV, EBV, roséole...




Varicella zoster: cycle infectieux

Le virus reste **latent**
dans les ganglions nerveux
et peut se réactiver:


- suite à une défaillance (SIDA, cancer, ...)
ou une diminution des capacités
immunitaires (âge)
- lors d'un nouveau contact avec le
virus

Infectious Diseases, by J. Cohen and W.G. Powderly



PATHOLOGIE ... Pourquoi ?

- *Varicella zooster* (chickenpox)
- Ganglion rachidien (corne dorsale) ou céphalique (face)
- Réactivation
- Neuralgie



**infection
primaire**

Persistence

Zona

Stankus et al. Am.Fam.Phys. 2000; 61: 2437-2444 & 2447-2448;
<https://www.aafp.org/afp/20000415/2437.html>
<http://farmadoc.be/farmamoz/goMozaiekStep1.htm>

Quels sont les risques de développer un Zona ?

- varicelle: maladie courante chez les enfants.
- réactivation: 5% des patients > 50 ans (10 % > 70 ans)
(↗ si immunosuppression)
- Incidence (cas pr 1000 personnes-an):
 - 2-3.4 chez les sujets sans risque
 - 3.9–11.8 chez les patients > 65 ans et/ou immunosuppression...

s'attendre à une ↗
dans le futur

- âge
- traitements immunosuppresseurs
- vaccination des enfants (moindre immunité à long terme)

cancer ...

greffe ...


SIDA ...

Femme enceinte

PATHOLOGIE : Comment ?

**Zona = réactivation du virus
dans un seul ganglion
nerveux**

**Pourquoi une atteinte
"qui suit les nerfs..."**



Substantia grisea

1. Cornu anterius
2. Cornu posterius
3. Commissura grisea

Substantia alba

4. Funiculus anterior
5. Funiculus lateralis
6. Funiculus posterior
7. Commissura alba anterior
8. Fissura mediana anterior
9. Sulcus medianus posterior


10. Canalis centralis
11. Radix anterior
12. Radix posterior
13. Ganglion sensorium nervi spinalis

Trigeminal Nerve
or Facial Nerve

What to Watch For:
Shingles is marked by
a red rash and blisters
that can appear on the
face or body. The
blisters are painful and
itchy.


Spinal Cord
and Nerves

Red Rash with Blisters




PATHOLOGIE : Comment ?

acute pain due to inflammation and nerve damage




Douleur neuropathique

voies de la douleur




<http://www.mayoclinicproceedings.com/>

douleur nociceptive vs neuropathique



Contrôle de la douleur au niveau périphérique





Contrôle des voies ascendantes de la douleur au niveau de la corne dorsale

...

Le passage des signaux nociceptifs vers le thalamus sont inhibés à la fois par

- 1. des voies descendantes (adrénergiques/sérotoninergiques) (contrôle central)**
- 2. des voies ascendantes (contrôle périphérique)**

Pourquoi des douleurs neuropathiques ?



Une lésion au niveau de la corne dorsale abolit le système de contrôle

- les signaux nociceptifs "passent" de façon non contrôlée
- douleurs intenses...



Soins pharmaceutiques: OTC ou pas ?

En cas de zona: traitement antiviral nécessaire
endéans les 72

Traitement tardif: ➤ du risque de douleurs postherpétiques

(> 60 ans: traitement anti-douleur à prescrire dans les 48 h)

➤ **Renvoyer le patient chez le médecin sans tarder**

OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - **médicament**
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - comment l'employer ?
 - Information complémentaire ...

1. ANTIVIRAL AGENTS

Aciclovir
(HSV-VSV)

... Herpes zoster: therapy (immunocompetent & Non immunocompetent patients) ... prevention of pain episodes (immunocompetent patients) ...

Valaciclovir

... Treatment of Herpes zoster infections for patients > 50y ... within $\leq 72h$ after rash ... Immunodeficiency: no limit on age ... until 7 days after disappearance of rash ...


Famciclovir

... Herpes zoster > 50y, especially to alleviate pain ... to start $\leq 72h$ after first dermal symptoms ... indication valid for immunocompetent and immunodeficient patients ...


Brivudine

... acute Herpes zoster in adults ... to start $\leq 72h$ after first dermal symptoms ... postherpetic neuralgia > 50y


[Source = SPC]



L'aciclovir: un analogue acyclique de la guanosine




présence d'un ribose
(OH en 3' et 5')



Modification du sucre:
structure non-cyclique
avec OH terminal (mimant le 5')
mais
absence d' OH mimant le 3'

structure inspirée de nombreux cytostatiques et immunosuppresseurs




Mode d'action de l'aciclovir


**Enzyme virale
responsable
de la 1ère
phosphorylation**




**activation
uniquement dans
les cellules infectées**



Mode d'action de l'aciclovir





Pharmacocinétique de l'aciclovir

- absorption orale

faible (bio-disponibilité: 10-20%)

- distribution

bonne y compris dans le SNC


faible liaison aux protéines (20-30%)

- élimination



- rénale (80 % sous forme inchangée) mais cristallise dans les tubules rénaux

- demi-vie courte (2-4 h)

Aciclovir / Valaciclovir ...




Biod. 10-20 %



Biod. 50-60 %



amélioration de la résorption intestinale



OBJECTIFS


- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - **à quoi doit servir le médicament ?**
 - comment l'employer ?
 - Information complémentaire ...

Buts du traitement par l'aciclovir

Ce qui est espéré endéans les 4 semaines

- **cicatrisation des lésions cutanées**
- **éviter les complications oculaires**
- **prévention des douleurs postherpétiques**



transversal: Hygiène !! (contamination facile)


OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - **comment l'employer ?**
 - Information complémentaire ...

Observance du traitement

- Compliance vs. adherence / concordance
- Therapeutic limit: arbitrarily 80%?
- Forgiveness (cf. J. Urquhart)
- In HIV 80-90% = treatment failure!
- (*Drug resistance?*)



Vrijens B. & Urquhart J. JAC 2005; 55: 616-627

transversal: autres médicaments ...

OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - comment l'employer ?
 - **Information complémentaire ...**



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'aciclovir

DELPHI

iPharma Entreprise Edition

Délivrance

12:00 14:35 **Mauroy CERP** 14:30 16:00 **Prod M.à J.** ? **Délivr Délivr Délivr**

Patient EVRARD pierre albert **Famille** EVRARD **AMI actif** 128/900 **Crédit argent** 0.00 0.00

Médecin TULKENS paul **Profil** Profil de base **Age** 40 ans **Crédits OA** 72.43 0.00

Facturer à **Vente N°** 17 **Validité SIS** 1/01/2008 **Crédits Ord** 4 0

Lecture SIS 16/12/2006 **Notes** 0 0

Dénomination	Qté	B	PPub	PUnit	Total	Pro	Rem	Rist	Stk	Min	Max	CBU
Aciclovir sandoz comp 35x800mg	1	0	24.60	24.60	24.60	0		7	0	0	0	1679000

Conseils adressés au patient

Vous pouvez prendre ce médicament pendant ou en dehors des repas
Respectez strictement la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux
N'empêche pas la transmission du virus à d'autres personnes
Il est recommandé de boire beaucoup

Conseils adressés au pharmacien

Peut être pris pendant ou en dehors des repas
Le patient doit respecter strictement la durée du traitement
N'empêche pas la transmission du virus (surtout en cas de lésions)
Il est recommandé de boire beaucoup (doses élevées)
INDICATIONS: herpès, zona, varicelle, ..

100386
pierre

Prix Mutuelle **Avec Ordonnance** **Avec FDD** **Magistrale** **Supprimer l'ordonnance** **Vente Précédente**

Au Comptant **Sans Ordonnance** **Forcer au comptant (vétérinaires)** **Delphi Interactions** **Flag DCI** **Boutons optionnels**

Posologie **ATC** **Divers**

aciclovir sandoz comp 35x800mg
Ad: 5x800 mg pj
Inf: >6 a.: 4x800 mg pj
Conseils imprimables

24.60 **24.60** **Clôture avec Ticket** **Clôture avec Double Ticket** **Acquitter la facture**

démarrer **iPharma Entreprise E...** **10:39**



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'aciclovir

Conseils adressés au patient

Vous pouvez prendre ce médicament pendant ou en dehors des repas
Respectez strictement la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux
N'empêche pas la transmission du virus à d'autres personnes
Il est recommandé de boire beaucoup

-

Conseils adressés au pharmacien

Peut être pris pendant ou en dehors des repas
Le patient doit respecter strictement la durée du traitement
N'empêche pas la transmission du virus (surtout en cas de lésions)
Il est recommandé de boire beaucoup (doses élevées)
INDICATIONS: herpès, zona, varicelle, ..

DELPHI



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'aciclovir

1. Usage du médicament ...	
conseil	explication
<i>Il est important de débiter ce traitement endéans les 24h après l'apparition du rash</i>	Plus efficace si la charge virale est limitée
<i>respectez strictement les heures de prise: 5x/jour!!</i>	Temps de demi-vie court: 2-4h
<i>Respectez strictement la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux</i>	• Au moins 7 jours • l'arrêt précoce du traitement augmente le risque d'échec clinique et de développement de résistance
<i>Vous pouvez prendre ce médicament pendant ou en dehors des repas</i>	• l'alimentation n'influence pas la biodisponibilité du médicament • l'alimentation peut augmenter la tolérance gastro-intestinale



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'aciclovir

2. Effets secondaires, interactions, contre-indications fréquentes et graves: Actions requises

problème	fréquence	Pourquoi ? Que faire ?
<i>Intolérance digestive (diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales)</i>	Fréquent	• l'alimentation n'influence pas la biodisponibilité du médicament • l'alimentation peut augmenter la tolérance gastro-intestinale
<i>Troubles SNC (céphalées, agitation, hallucination, convulsions)</i>	Assez fréquent	• arrêt du traitement • consultation médicale
<i>Insuffisance rénale réversible</i>	rare	• arrêt du traitement • consultation médicale
<i>Toxicité sanguine</i>	Très rare	• Contrôle médical: formule sanguine



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'aciclovir

3. Conseils non-pharmacologiques

conseil

explication

*Il est recommandé de boire beaucoup
(surtout patient âgé ...)*

- La diurèse favorise l'élimination du médicament et évite la toxicité rénale (peut cristalliser dans les tubules rénaux)

Éviter les contacts directs avec d'autres personnes

- médicament virostatique
- la maladie reste contagieuse


Choix thérapeutiques (si prescription sous DCI)

Medicament	Dosage	Coût (euro)
------------	--------	-------------

Aciclovir

800 mg 5x/jr
7 jours

24.60-93.90



Aciclovir EG (Eurogenerics) ▲

[aciclovir]
compr.

€ 25 x 200 mg	R _x	a! b!	€ 22,19
---------------	----------------	-------	---------

compr. (séc.)

€ 35 x 800 mg	R _x	a! b!	€ 75,03
---------------	----------------	-------	---------

Aciclovir Kela (Kela) ▲

[aciclovir]
compr.

€ 25 x 200 mg	R _x	a! b!	€ 15,95
---------------	----------------	-------	---------

Aciclovir Sandoz (Sandoz) ▲

[aciclovir]
compr. (séc., sol.)

€ 25 x 200 mg	R _x		€ 16,70
---------------	----------------	--	---------

€ 35 x 800 mg	R _x		€ 24,60
---------------	----------------	--	---------

Docaciclo (Docpharma) ▲

[aciclovir]
compr. (séc.)

€ 25 x 200 mg	R _x	a! b!	€ 16,88
---------------	----------------	-------	---------

€ 35 x 800 mg	R _x	a! b!	€ 26,89
---------------	----------------	-------	---------

Zovirax (GSK) ▲

[aciclovir]
compr. (séc.)

€ 25 x 200 mg	R _x	a! b!	€ 28,72
---------------	----------------	-------	---------

€ 35 x 800 mg	R _x	a! b!	€ 93,90
---------------	----------------	-------	---------

susp.

€ 100 ml 400 mg/5 ml	R _x	a! b!	€ 30,04
----------------------	----------------	-------	---------

€ 200 ml 400 mg/5 ml	R _x	a! b!	€ 49,33
----------------------	----------------	-------	---------

Chiox thérapeutiques: au delà de l'aciclovir

<u>Medicament</u>	<u>Dosage</u>	<u>Coût (euro)</u>
Aciclovir	800 mg 5x/jr 7 jours	24.60-93.90
Valaciclovir	1000 mg 3x/jr 7 jours	135.48
Famciclovir	500 mg 3x/jr 7 jours	146.15
Brivudine	125 mg 1x/jr 7 jours	91.14



Première délivrance: Mr. Rash

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
	Cachet du pharmacien au verso
	Exécuté le :
REPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR:	
Nom et prénom du patient:	<i>7. Rash</i>
(Souligner la mention adéquate)	
Réservé à la vignette du conditionnement	<i>R/ Zovirax 800 mg 5 x/jour pendant 5 jours</i>
	<i>R/ Nimesulid 100 mg 2 x/jour</i>
Cachet du prescripteur	Date et signature du prescripteur
	Dr A. V.



2. Douleurs et complications

Situation aiguë

1. Douleurs en phase aiguë

- traitement des lésions: chlorhexidine / glace / pansements humides
- paracétamol
- AINS (risque chez le patient âgé)
Tramadol...
- Corticoïdes systémiques

la
chlorhexidine
a une action
synergique
avec celle de
l'aciclovir


2. prévention des neuralgies postherpétiques

(essentielle chez le patient âgé)

- Commencer le traitement antiviral rapidement (< 72 h)
- Amitriptyline: 10-40 mg par jour


NEURALGIE : PERSPECTIVES

Postherpetic neuralgia: Natural course



NEURALGIE : PERSPECTIVES

Postherpetic neuralgia > 60y: severity






Présentation du cas du Patient 1: Mr. Rash

6 semaines plus tard
Monsieur Rash revient
à la pharmacie avec
l'ordonnance suivante:

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
	Cachet du pharmacien au verso Exécuté le :
REPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du patient: <i>7. Rash</i> Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate) Réservé à la vignette du conditionnement	
	<i>R/ Amitriptyline 10 mg 100 co. S/ 1 x/jour</i>
Cachet du prescripteur	Date et signature du prescripteur <i>Dr A. V.</i>



Douleurs et complications

Traitement des douleurs postherpétiques

- Antidépresseurs tricycliques:
 - diminue la douleur dans 50% des cas
 - suppression (partielle à totale) après 3-5 semaines
- Gabapentine (non remboursé)
- Pregabaline (non remboursé)
- Capsaïcine / lidocaïne en adm. locale ?
- Doluxetine
- autres thérapies ?




**attention
lors de la préparation;
irritant pour les
muqueuses**

<http://www.mayoclinicproceedings.com/>

Prise en charge des douleurs neuropathiques

Figure 1

Pharmacologic Treatments for Neuropathic Pain: Comparison of Efficacy



NNT with 95% confidence interval for different drug classes in the treatment of pain in polyneuropathy, with treatments arranged according to NNT value. N(active)=total number of patients on active treatment and N(placebo)=total number of patients on placebo treatment.

Source: Sindrup SH, Jensen TS. Pharmacologic treatment of pain in polyneuropathy. Neurology 2000;55(7):915-20. Reprinted with permission.

NNT= nombre de patients à traiter pour obtenir 1 patient avec > 50% de soulagement de sa douleur....

- antidépresseurs trycliques:
2.6 (dose "flexible")
1.4 (dose optimale)
- inhibiteurs de la recapture de la sérotonine: 6.7

OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - **à quoi doit servir le médicament ?**
 - comment l'employer ?
 - Information complémentaire ...

Buts du traitement par l'amitryptiline

Ce qui est espéré endéans les 6-8 semaines

- diminution des douleurs neuropathiques

Renforcement des voies
nor-adrénergiques

1




Fig. 40.4 Schematic diagram of the gate control system.

OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - **comment l'employer ?**
 - Information complémentaire ...

Comment le patient doit-il employer le médicament ?

Medication	Dosage	Cost (euro)
Aciclovir	800 mg 5x/jr (toutes les 4h) 7 days	24.60-93.90
Amitriptyline	10 - 40 mg/jr (dose ascendante !!)	...

Redomex (Lundbeck)			
[amitriptyline]			
caps. Diffucaps (lib. prolongée)			
€ 40 x 25 mg	R _x	b ○	€ 4,89
€ 40 x 50 mg	R _x	b ○	€ 7,96
€ 20 x 75 mg	R _x	b ○	€ 5,82
compr.			
€ 100 x 10 mg	R _x	b ○	€ 3,36
€ 30 x 25 mg	R _x	b ○	€ 2,29
€ 100 x 25 mg	R _x	b ○	€ 6,34
flacon i.m. - i.v.			
€ 10 ml 10 mg/1 ml	R _x	b ○	€ 1,83
Posol. per os: jusqu'à 150 mg p.j. en plusieurs prises			



OBJECTIFS

- se poser des questions ...
- consulter les sources ...
- répondre aux questions ...

- Connaissance ?
 - physiopathologie
 - médicament
- Comment traduite cette connaissance ?
 - à quoi doit servir le médicament ?
 - comment l'employer ?
 - **Information complémentaire ...**



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'amitryptiline

1. Usage du médicament	
conseil	explication
<i>Commencer avec une faible dose, augmenter progressivement la posologie</i> <i>Ex. 10-25 mg/jr pendant 7 jours</i> <i>ensuite, si pas d'efficacité, augmenter par paliers de 10 -25 mg/semaine) jusqu'à un maximum de 75-150 mg/jr ^{a,b}</i>	Titrer la dose de façon individuelle

^a Jackson KC Pharmacotherapy for Neuropathic Pain. Pain Practice 6 (1), 27-33

^b **utiliser les doses faibles pour les patients agés** (Dworkin *et al.* Recommendations for the management of herpes zoster. Clin Infect Dis. 2007 Jan 1;44 Suppl 1:S1-26).

Les antidépresseurs tricycliques ne sont pas des bonbons ...

Table 2. Side effects of tricyclic antidepressants¹⁸

Side effects	1. Anticholinergic effects Dry mouth, constipation, blurred vision, urinary retention, dizziness, tachycardia, memory impairment, delirium) 2. Sedation 3. Alpha-1-adrenergic effects Orthostatic hypotension/syncope 4. Cardiac conduction delays/heart block Arrhythmias, Q-T prolongation 5. Other side effects Weight gain, excessive perspiration, sexual dysfunction
Severity	Tertiary > secondary agents

Patient âgé

McQuay et al. A systematic review of antidepressants in neuropathic pain.
Pain. 1996;68:217–227.

Compared with placebo, of 100 patients with neuropathic pain who are given antidepressants, 30 will obtain more than 50% pain relief, 30 will have minor adverse reactions and 4 will have to stop treatment because of major adverse effects.



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'amitryptiline

2. Effets secondaires, interactions, contre-indications fréquentes et graves: Actions requises

problème	fréquence	Que faire
<i>Effets anticholinergiques</i> (rétention urinaire, hypertrophie de la prostate, glaucome à angle étroit, xérostomie, troubles visuels, constipation)	élevée	•Vérifier les risques pour le patient
<i>Sédation</i>	élevée	•Éviter de conduire, utiliser des machines •Eviter les autres sédatifs (alcool, benzo...)
<i>Hypotension orthostatique</i>	1/5	•Se lever prudemment
<i>Interaction avec inhibiteurs MAO</i> (risque de syndrome sérotoninergique)		•Minimum 14 jours d'intervalle
<i>Interaction avec inhibiteurs CYP2D6 et CYP3A4</i>		•Diminuer la posologie



Soins pharmaceutiques: conseils lors de la première délivrance d'amitryptiline

2. Effets secondaires, interactions, contre-indications fréquentes et graves: Actions requises

problème	fréquence	Que faire
<i>Effets anticholinergiques</i> (rétention urinaire, hypertrophie de la prostate, glaucome à angle étroit, xérostomie, troubles visuels, constipation)	ND	•Vérifier les risques pour le patient
<i>Sédation</i>	ND	•Éviter de conduire, utiliser des machines •Eviter les autres sédatifs (alcool, benzo...)
<i>Hypotension orthostatique</i>	ND	•Se lever prudemment
<i>Interaction avec inhibiteurs MAO</i> (risque de syndrome sérotoninergique)	ND	•Minimum 14 jours d'intervalle
<i>Interaction avec inhibiteurs CYP2D6 et CYP3A4</i>	ND	•Diminuer la posologie

le patient
est âgé...

le patient
boit 2-3
verres de
vin ...



Première délivrance: quelques messages généraux

- **Devant un symptôme même banal,**
 - Ne proposer des médicaments de comptoir que pour une durée limitée
 - Envoyer chez le médecin si les symptômes persistent

- **Attitude constructive lors de la détection d'un problème pharmaco-thérapeutique dans une ordonnance**
 1. le patient à besoin d'une pharmacothérapie mais ne la reçoit pas
 2. le patient prend un médicament inadapté
 3. le patient reçoit le médicament correct mais à une dose trop faible
 4. le patient reçoit le médicament correct mais à un dose trop élevée
 5. le patient présente des effets secondaires
ou a des risques particuliers d'en développer
 6. le patient subit ou a des risques de subir une interaction
 7. le patient ne prend pas son médicament
 8. le patient prend un médicament sans indication valable
 9. le patient prend un médicament au mauvais moment



Première délivrance: quelques messages généraux

➤ Communication

- concise et langage adapté
- orale et écrite (aide écran et ticket/étiquette)
- pouvant améliorer l'observance
 - nécessité des prises multiples de l'antiviral
 - indication particulière de l'antidépresseur pour la douleur neuropathique
- Informant sur les effets secondaires
 - en fonction de leur fréquence et de leur importance pour le patient considéré
 - donner les conseils pratiques: que faire en cas de survenue d'un effet secondaire



Références ...

- Jackson KC. Pharmacotherapy for Neuropathic Pain. *Pain Practice* 2006; 6 (1), 27-33
- Dworkin *et al.* Recommendations for the management of herpes zoster. *Clin Infect Dis.* 2007;44 Suppl 1:S1-26..
- CBIP – fiche de transparence sur le Zona (janvier 2005)

Disponibles sur i-campus ...