HHV6, HHV7 - faut-il diagnostiquer ces infections?

HHV6 - HHV7

HHV6

HHV7

ADN

160 - 170 Kb

140 - 160 Kb

Homologie

Variants

46 - 85% HHV6

A

B

95 - 99%

41 - 75% CMV

Tropisme

cell mononucléées du sang
périphérique (PBMC) surtout
lymphocytes TCD4 +

lymphocytes CD4
mono-macrophages (SK)

Culture

Variant A : lymphocytes de cordon,
lignées établies (HSB2), ...
Variant B : PBMC matures activés,
lignées MOLT3, MT4

lymphocytes de cordon ou
PBMC activés, SUP T-1

Latence

PBMC, progéniteurs médullaires,
mono-macrophages

PBMC

Récepteur

CD46

CD4

Séroprévalence

100% à 24 mois

75% 12-23 mois

Site de réplication

salive

salive

Infection primaire

Variant A : ?

ES

Variant B : ES

HHV6

FIG. 2. HHV-6 cytopathic effect. **A:** Uninfected CBL. **B:** HHV-6B(Z29)-infected CBL 5 days postinfection. The infected cell culture shows loss of normal lymphocyte clumping and the presence of large, “ballooning,” refractile cells.

HHV7

FIG. 1. CPE and virion structure exhibited by HHV-7 (RK). Cells viewed in the light microscope after mock infection (**a**) or 7 days after infection with HHV-7 (RK) (**b-d**). In **b-d**, note refractile ballooning cells with distinct binding membrane and cells that appear to have undergone fusion. **e,f**: Virions viewed in the electron microscope. From Frenkel et al. (37), with permission.

Manifestations cliniques de la primo-infection

1988 - Yamanishi

HHV6 variant B

exanthème subit de l'enfant
(roséole, 6^{ème} maladie)

Primo-infection: 3-12 mois → tous infectés à 2 ans
Séroprévalence à l'âge adulte: 95-100%

Primo-infection: 3-12 mois —————> **tous infectés à 2 ans**
Séroprévalence à l'âge adulte: 95-100%

Primo-infection: 3-12 mois —————> **tous infectés à 2 ans**
Séroprévalence à l'âge adulte: 95-100%

Transmission
(salive,..)

primoinfection

Virémie
3-6 j

Tissus

Sécrétions
(salive, urines)

Persistance à l'état latent

Réactivation

maladie

Maladies associées à la réactivation de l' HHV6 chez l' hôte immunocompétent

***Syndrome de fatigue chronique, sclérose en plaques,
lymphadénite de Kikuchi, certaines lymphomes, syndrome
de Sjögren, sarcoïdose, le lupus,...***

***Rôle étiologique de l' HHV6 dans ces maladies
NON PROUVE***

***Quelles sont les conséquences de l'infection
due au virus HHV6
après transplantation d'organe solide
ou de moelle ?***

- **Population sans anticorps HHV6**

2. Population possédant des anticorps HHV6

avant transplantation

1. Population sans anticorps avant transplantation

très rare: séroprévalence 95-100%

primoinfection: tableaux cliniques sévères

Infection disséminée fatale due à l' HHV6 variant A après transplantation rénale

**Primoinfection
à HHV6 variant A**

J20

PCR +++
culture +++

décès

Pneumopathie interstitielle

encéphalite

hépatite

Hémophagocytose, aplasie médullaire

2. Population avec anticorps

Réactivation fréquente de l'HHV6 après transplantation

- détection d' HHV6 par PCR

moelle	38-60%
reins	38-55%
foie	28-31%
cœur	??
cœur-poumons	??

- précoce après transplantation (1 mois)
(CMV 2 mois)

HHV6 chez les transplantés médullaires

Association de l'infection HHV6 avec :

- retard ou absence de prise de greffe (granulocytes et plaquettes)
- pneumopathies, encéphalites
- éruptions rappelant l'exanthème de l'infection primaire
- fièvre, GVHD
- rien

Variant B

In vitro : HHV6 (variant A) inhibe la croissance et la maturation des cellules progénitrices par inhibition des facteurs de croissance et par effet direct.

HHV6 chez les transplantés d'organes

Association de l'infection HHV6 avec :

- ↗ infections opportunistes et maladie à CMV
- rejet (rein, foie)
- encéphalopathie - encéphalite
- suppression médullaire (foie)
- rien

Etude de l' infection à HHV6 chez les transplantés (cardio)-pulmonaires (Erasmus)

Etude prospective (*Jacobs et al, Transplantation, 2003*)

27 mois

56 patients dont 30 inclus dès la transplantation

- ***Détection d' HHV6 par PCR et culture***

PBMC 1x/sem intrahospitalier

1x/1-2 mois extrahospitalier

tous les spécimens obtenus dans suivi habituel

(LBA, TBB,..)

autopsies

- ***Recherche virologique et microbiologique extensive
des autres agents pathogènes***

J0-100

30 pts

PCR positive: 20/30 pts (66%)
Durée PCR +: 869/2551 (34%)
(jours-patients)

culture positive: 8/20 pts (40%)
délai culture +: moyenne: 26j

% cumulé de patients
avec PCR positive

J0-100

J > 100

30 pts

48 pts

PCR positive:

20/30 pts (66%)

27/48 (56%)

Durée PCR +:

869/2551 (34%)

4054/21016 (19%)

(jours-patients)

culture positive:

8/20 pts (40%)

3/27 pts (11%)

délai culture +:

moyenne: 26j

% cumulé de patients
avec PCR positive

Manifestations cliniques associées à l' HHV6

50 épisodes cliniques compatibles avec une infection concomitants à la détection d' HHV6

• 48 épisodes: agents étiologiques clairement identifiés et pouvant expliquer l' ensemble des signes cliniques

(bactéries 39, mycoses 2, protozoaires 2, virus 9)

Manifestations cliniques associées à l' HHV6

50 épisodes cliniques compatibles avec une infection concomitants à la détection d' HHV6

- **48 épisodes: agents étiologiques clairement identifiés et pouvant expliquer l' ensemble des signes cliniques**

(bactéries 39, mycoses 2, protozoaires 2, virus 9)

- **2 épisodes non associés à un pathogène autre que l' HHV6**

pneumonies interstitielles (J52, J120)

traitement par acyclovir (1) et ganciclovir (1)

guérison

?? Rôle de l' HHV6

- **Manifestations cliniques directement liées à l' HHV6:**
peu importantes si immunité préalable

- **Différence de mortalité entre les patients avec et sans réactivation d'HHV6**

- **La différence de mortalité entre patients avec et sans réactivation d 'HHV6 pourrait-elle être attribuée à des effets indirects de l 'HHV6 ??**

Effet immunosupresseur et/ou proinflammatoire?

Rejet de greffe

Interaction avec d' autres infections

HHV6 = un virus immunosuppresseur *in vitro*

Thymus

Déplétion des thymocytes
(surtout progéniteurs T)

HHV6 = un virus immunosuppresseur *in vitro*

HHV6 = un virus immunosuppresseur *in vitro*

HHV6 = un virus immunosuppresseur *in vitro*

- ***Le nombre de rejets traités est identique chez les patients avec ou sans réactivation d' HHV6***

	HHV6 -	HHV6 +	
Densité d 'incidence de rejets traités par 1000 jours-patients	15	14	NS

Complications infectieuses

	<u>Périodes HHV6+</u>	<u>Périodes HHV6-</u>
Pathogènes		
Bactéries		
Pneumonies	9	8
Septicémies	2	1
Autres	2	1
	(diverticulites)	(sternite)
Virus	5	1
	(3 CMV, 1EBV, 1HSV)	(CMV)
Mycoses	4	0
	1 aspergillose pulm. 1 médiastinite Candida 1 péritonite Candida	

p = 0.15

Conclusions

infection à HHV6

***Morbidité
mortalité***

infection à HHV6

Effets directs

asymptomatique

Infection disséminée

***Morbidity
mortality***

infection à HHV6

Effets directs

Effets indirects

- **La réactivation de l' HHV6 pourrait n' être qu' un marqueur d' un état d' immunosuppression plus important**

*Réactivation fréquente
et précoce*

*Interaction avec
l' HHV6 in vitro*

HHV7

```
graph TD; HHV7[HHV7] --> A[Réactivation fréquente et précoce]; HHV7 --> B[Interaction avec l' HHV6 in vitro]; HHV7 --> C[Rôle pathogène encore inconnu];
```

Rôle pathogène encore inconnu

Diagnostic HHV6 - HHV7

Sérologie Ig - IgM HHV6 - HHV7

IFA : problème de seuil

de sensibilité (type de cellules infectées,
fixation, ...)

de réaction croisée HHV6 - HHV7

EIA : problème de spécificité

Immunoblot : protéines spécifiques de HHV6 - HHV7

→ A l'avenir, développement de techniques plus spécifiques de chacun des virus (peptides recombinants)

Diagnostic HHV6 - HHV7

Isolement des virus

- **Coculture des lymphocytes du sang périphérique avec :**
 - lymphocytes de sang de cordon
 - lymphocytes de donneurs adultes
 - lignées T sensible
- **Apparition d 'ECP :** ballonnisation des cellules
syncytiums
identification par anticorps
monoclonaux spécifiques
- ➔ **A l 'avenir, système de culture rapide et d 'antigénémie
(cf CMV)**

Diagnostic HHV6 - HHV7

Détection d'antigènes ou d'Ac nucléiques spécifiques

- **Mise en évidence d'Ag viraux** dans des tissus, cellules à l'aide d'ac monoclonaux (immunohistochimie)
 - **Mise en évidence d'Ac nucléiques**
hybridation sur tissu, cellules avec sondes spécifiques
amplification génique de séquence spécifiques, tout prélèvement
- ➔ Importance de quantifier la charge virale

Faut-il diagnostiquer les infections HHV6 - HHV7 ?

Hôte normal, non immunodéficient

- **Enfant** : en cas de problème de convulsions fébriles, méningite, encéphalites
- **Adultes** : rares cas d'infections graves à HHV6 par sérologie, par amplification génique

Hôte immunocompromis

- Réactivation fréquente
 - Détection (PCR) fréquente
- } sans signification clinique évidente

CMV >> HHV6 > HHV7

Peu de méthodes commerciales. Méthodes in-house
Pathologies associées à HHV6-HHV7 peu claires
Pas d'évaluation clinique correcte de l'action d'antiviraux.
Méthodes quantitatives (antigène, PCR) à évaluer

Efficacité des antiviraux sur HHV6 et HHV7

- Non établie in vivo - pas d'études
- In vitro : **HHV6**
 - foscarnet, cidofovir > ganciclovir > aciclovir
 - HHV7** : cf HHV6 ??
- Effet prophylaxie CMV sur réactivation HHV6
 - ganciclovir > aciclovir
 - notre expérience : aciclovir = 0
 - ganciclovir retarde la réactivation HHV6

Autre virus ?

HHV7

HHV6

CMV